



# Radiología



## DESARROLLO DEL TOBILLO EN LA EDAD PEDIÁTRICA: ¿QUÉ ES NORMAL?

R. Bernardo Palomar, J. Cabezudo Pedraza, P. Gamo Villegas, S. Allodi de la Hoz, J. Capilla Ampudia y D. Rioja Santamaría

Hospital Universitario de Fuenlabrada, Madrid, España.

### Resumen

**Objetivos:** Estudiar los cambios que aparecen en el desarrollo del tobillo durante la edad pediátrica mediante resonancia magnética (RM).

**Material y métodos:** Estudio retrospectivo de 88 RM de tobillo con edades comprendidas entre 0-17 años, realizadas en nuestro centro entre 2004-2017. Hemos analizado cortes sagitales potenciados en T1 y STIR. Se ha valorado la intensidad de señal de la médula ósea en función de la edad. Se ha estudiado también la evolución que presenta el cartílago articular y el cartílago epifisario.

**Resultados:** Se han observado cambios de la intensidad de señal en la médula ósea en el 70% de los niños estudiados. Estos cambios en la intensidad de señal han aparecido en edades comprendidas entre los 2 y 16 años. El calcáneo ha sido el hueso con mayor presencia de alteraciones en la intensidad de señal, seguido del astrágalo y el escafoides. Hemos visto que tanto el cartílago articular como el epifisario varían de tamaño e intensidad de señal en función de la edad.

**Conclusiones:** Existen características particulares radiológicas en el desarrollo del tobillo del niño que el radiólogo debe conocer y no confundir con patología.