



# Radiología



## MALFORMACIONES LINFÁTICAS EN EDAD PEDIÁTRICA, ALGUNOS CASOS REPRESENTATIVOS

C. Pascual Montero<sup>1</sup>, R. Domínguez Piedra<sup>2</sup> y M.I. Martínez León<sup>3</sup>

<sup>1</sup>C.H.U. Cáceres, Cáceres, España. <sup>2</sup>Hospital Regional Universitario de Málaga, Málaga, España. <sup>3</sup>Hospital Materno-Infantil, C.H.U. de Málaga, Hospital Vithas Parque San Antonio, Málaga, España.

### Resumen

**Objetivos docentes:** Se revisará el origen y clasificación de las malformaciones vasculares de tipo linfático de presentación en edad pediátrica, centrándose en las características radiológicas para un determinar un adecuado diagnóstico, tratamiento y seguimiento.

**Revisión del tema:** Las malformaciones linfáticas suponen la segunda lesión vascular más frecuente en pediatría, pudiendo encontrarse de forma aislada o en el contexto de otras patologías (por ejemplo, síndrome de Gorham Stout). Son malformaciones vasculares de bajo flujo que están presentes al nacimiento y su crecimiento es proporcional al desarrollo del niño. Se localizan más frecuentemente en el triángulo cervical posterior aunque pueden presentarse a lo largo del resto del cuerpo. Suelen diagnosticarse de manera incidental, por sintomatología derivada de la compresión de estructuras vecinas o por sobreinfección. La prueba de imagen inicial es la ecografía (US), presentándose como masas multiquísticas macro o microquísticas, con septos ecogénicos y flujo doppler intraseptal. El siguiente paso en imagen es la resonancia magnética (RM) que ayuda a definir la extensión y anatomía lesional, pudiendo observar niveles líquido-líquido en relación con material hemático y de depósito. El diagnóstico diferencial se plantea con otras malformaciones vasculares, abscesos, otras malformaciones congénitas y teratomas quísticos. El tratamiento de estas lesiones abarca desde el conservador hasta la exéresis quirúrgica pasando por el intervencionismo (escleroterapia intralesional).

**Conclusiones:** Las malformaciones linfáticas son la segunda lesión vascular más frecuente en la edad pediátrica, por ello su conocimiento radiológico es necesario. Se realiza un repaso de varias localizaciones y de la presentación clínica y radiológica de estas malformaciones linfáticas mediante US y RM.