



# Radiología



## NÓDULOS PALPABLES EN ECOGRAFÍA. ¿QUÉ DEBEMOS TENER EN CUENTA?

*D. Quintana Blanco, G. Larrañaga Hernando, A. Ostapenko, F. Miner Pino, Á. Sánchez García y M. Gómez López de Munain*

*Hospital Universitario de Álava, Vitoria, España.*

### Resumen

**Objetivos docentes:** Los nódulos palpables son un motivo de consulta médica frecuente. En la ecografía de cualquier lesión de partes blandas debemos ser capaces de diagnosticar las lesiones benignas y malignas más frecuentes, y reconocer criterios infiltrativos o de malignidad.

**Revisión del tema:** Las lesiones más frecuentes: 1. Lesiones focales benignas: Quiste de inclusión epidérmica, pilomatricoma, neurofibroma, tumores vasculares, lipoma, fibromatosis, tumor de células granulares, lesiones infecciosas y traumáticas. 2. Lesiones focales malignas: Melanoma, metástasis, carcinoma basocelular, carcinoma de células escamosas y sarcomas. 3. Lesiones en localizaciones típicas: Quiste pilonidal, hidrosadenitis, quiste sinovial, tumoraciones axilares, digitales y olecranianas, lipoatrofia semicircular e hipertrofia del tensor de la fascia lata.

**Conclusiones:** La ecografía es una eficaz herramienta para orientar hacia alguna de las lesiones comentadas y/o valorar la necesidad de otras exploraciones.