



Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular



0 - UTILIDAD DE LA 18F-FLUOROCOLINA PET/CT EN LA DETECCIÓN DE ENFERMEDAD ÓSEA METASTÁSICA EN PACIENTES CON CÁNCER DE PRÓSTATA TRATADOS RADICALMENTE Y EN SITUACIÓN DE RECIDIVA BIOQUÍMICA. COMPARACIÓN CON LA GAMMAGRAFÍA ÓSEA

Y.E. Ramírez Escalante, S. Rodado Marina, A. Martínez Lorca, S. Rizkallal Monzón, G. Villoria Almeida, I. Santos Gómez, M.P. Orduña Díez, M.D. Marín Ferrer y M. Coronado Poggio

Hospital Universitario La Paz. Madrid.

Resumen

Objetivo: Evaluar la utilidad clínica de la PET/CT con ^{18}F -fluorocolina (^{18}F -colina-PET/CT) en comparación con la gammagrafía ósea (GO) en detectar metástasis óseas en pacientes con cáncer de próstata (CaP) tratados y en situación de recidiva bioquímica (RB).

Material y métodos: Analizamos retrospectivamente 82 pacientes (edad media: 69,6 años, rango: 51-84) diagnosticados y tratados radicalmente de CaP en situación de RB (PSA medio 6,6 ng/ml, rango: 0,12-93), referidos para ^{18}F -colina-PET/CT y GO. Los hallazgos fueron categorizados como positivos para metástasis óseas o negativos; se hizo análisis por pacientes. Se utilizó como gold estándar los resultados en otras pruebas de imagen y/o seguimiento clínico. Se consideró válido un intervalo máximo entre ambas exploraciones de 14 meses (media: 5,4 meses, rango: 1-14). Se realizó análisis separado de los pacientes que estaban en tratamiento hormonal respecto a los que no cuando la ^{18}F -colina-PET/CT.

Resultado: Los valores de sensibilidad, especificidad, VPP, VPN y exactitud diagnóstica para la ^{18}F -colina-PET/CT fueron de 94%, 97%, 88% y 98% respectivamente; y para la GO de 71%, 91%, 66% y 92%, respectivamente. Concordancia entre ^{18}F -colina-PET/CT y GO en 70 pacientes de 82 (85%). En 12 pacientes discordancia, 10 (5 FP y 5 FN) fueron falsos resultados de la GO. La sensibilidad de la ^{18}F -colina-PET/CT fue mayor en aquellos pacientes que no estaban recibiendo tratamiento hormonal en el momento de la exploración (100% vs 94%).

Conclusiones: Si bien en la práctica clínica la ^{18}F -colina-PET/CT no puede reemplazar a la GO, su mayor sensibilidad y especificidad la sitúa como una herramienta de gran utilidad que se debe tener en cuenta en la reestadificación de este grupo de pacientes, sobre todo ante alta sospecha clínica de enfermedad ósea metastásica y hallazgos negativos/equívocos en la GO. Aunque no es definitivo, se debe tener en cuenta la presencia de tratamiento hormonal en el momento de la exploración PET/CT.