



# Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular



## 50 - CONCORDANCIA INTEROBSERVADOR Y VALOR ADICIONAL EN LA CLASIFICACIÓN DE LAS AFASIAS DEL PET 18F-FDG CEREBRAL CON CONTROL CLÍNICO EVOLUTIVO

P. Oliván-Sasot<sup>1</sup>, P. Sopena-Navales<sup>1</sup>, A. Cuevas-Jiménez<sup>2</sup>, P. Bello-Arques<sup>1</sup>, V. Vera-Pinto<sup>1</sup>, A.M. Yepes-Agudelo<sup>1</sup>, M. Agudelo-Cifuentes<sup>1</sup> y C. Llorca-Ruíz<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Medicina Nuclear; <sup>2</sup>Neurología. Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia.

### Resumen

**Objetivo:** Concordancia interobservador de PET <sup>18</sup>F-FDG en afasias. Consenso entre patrón de demencia en PET <sup>18</sup>F-FDG y control clínico. Valor adicional de la PET en la caracterización clínica.

**Material y métodos:** Estudio retrospectivo de 25 pacientes (17 mujeres y 8 hombres), de edad mediana de 69,36 años (53-84) con diagnóstico inicial de afasia primaria progresiva (APP). Método diagnóstico: PET/CT (Philips Gemini TF) 30 minutos post-inyección de 148 MBq (4 mCi) de <sup>18</sup>F-FDG. Criterios de inclusión: pacientes diagnosticados y seguidos en la unidad de demencias del Hospital Universitario y Politécnico la Fe de Valencia, exploración PET realizada entre abril/2014-mayo/2016, edad entre 50-90 años, diagnosticados de APP. Imágenes de afasia clasificadas independientemente por 2 facultativos: un experto en neurología nuclear y un residente, llegando siempre al consenso. Correlación entre diagnóstico clínico de control (evolución clínica ± pruebas complementarias) y patrón de demencia de <sup>18</sup>F-FDG en: enfermedad de Alzheimer (EA), demencia frontotemporal (DFT), demencia por cuerpo de Lewy (DCLw) y otros. Concordancia de observaciones mediante el índice kappa global.

**Resultado:** Todos los pacientes toleraron la exploración y ninguno presentó reacciones adversas. La concordancia de las observaciones en APP mediante el índice kappa global fue del 88% (casi perfecta). En las demencias observadas, se obtuvo correlación de 76% entre PET y diagnóstico final establecido (muy buena). En nuestra serie: 10 pacientes diagnosticados clínicamente de EA (7 afasias semánticas y 3 logopénicas), 12 DFT (6 semánticas y 6 no fluentes), 1 caso de DCLw (afasia logopénica) y 2 casos pendientes de filiar.

**Conclusiones:** La concordancia de la clasificación de APP mediante PET es casi perfecta, pudiéndolo utilizarla como herramienta diagnóstica estandarizable. La concordancia de clasificación de demencias entre patrón de captación de <sup>18</sup>F-FDG y diagnóstico es muy buena, habiendo un buen consenso entre la imagen PET y los casos con diagnóstico clínico post-prueba ya establecido (19/25), pudiendo establecerse como predictor.