



Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular



0 - ANÁLISIS DEL INCREMENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ADQUISICIÓN DE TOMOGRAFÍA POR EMISIÓN DE POSITRONES EN EL HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

J. Ribera Perianes, X. Cases Moreno, D. Bujan Leiva, E. Marcos Segura y D. Fuster Pelfort

Servicio de Medicina Nuclear. Centre de Diagnòstic per la Imatge. Hospital Clínic de Barcelona.

Resumen

Objetivo: La evolución tecnológica experimentada por los tomógrafos PET-TC, ha motivado una inclusión progresiva de nuevas indicaciones diagnósticas, aspecto que ha propiciado un incremento del número de protocolos de adquisición existentes. Nuestro objetivo ha sido identificar su variabilidad asociándola a su complejidad exploratoria.

Material y métodos: Se han analizado retrospectivamente, los protocolos correspondientes a los 2900 estudios PET-TC asistenciales realizados en 2016 para determinar sus características procedimentales y técnicas.

Resultado: Durante ese periodo se pautaron 62 protocolos diferentes. El grupo de estudios de cuerpo entero es el que presentó una mayor variabilidad (56 tipos), siendo además el tipo de adquisición con mayor número de exploraciones realizadas (2.707, 93,4% del total). Se han identificado tres ítems causantes del aumento de complejidad del procedimiento estándar de adquisición: Un 40% utilizaron contrastes radiológicos (contraste oral, contraste endovenoso o ambos), un 38% adquisiciones complementarias asociadas a un procedimiento principal denominadas Complemento PET (Cuerpo entero, Hanging Breast, Bed Cardíaco, Dual Point, Cerebro, Cabeza y cuello, Estudio dinámico y TC tórax) y sólo un 1,07% necesitaron procedimientos técnicos auxiliares complejos (Sedación, Gating respiratorio, Planificación radioterápica y/o Electroencefalograma). De los 2.900 estudios analizados, el 69,78% llevaba asociado al menos uno de los tres ítems descritos. El 26,72% un complemento PET; el 17,10% sólo contraste oral; el 13,34% contraste oral y endovenoso; el 3,93% dos tipos de complementos PET; el 2,83% un complemento PET más contraste endovenoso y oral; el 2,07% un complemento PET más contraste oral y el 3,79% remanente corresponde al resto de protocolos agrupados que no superaban por separado el 1,5% del total.

Conclusiones: La variabilidad de los protocolos realizados es mayoritariamente consecuencia del aumento de la complejidad de los estudios, principalmente relacionada con la combinación individual o asociada de procedimientos complementarios (Complemento PET) y utilización de contrastes radiológicos.