



# Revista Española de Medicina Nuclear e Imagen Molecular



## PO030 - DIAGNÓSTICO DE MUERTE ENCEFÁLICA CON GAMMAGRAFÍA DE PERFUSIÓN CEREBRAL CON GAMMACÁMARA PORTÁTIL

*Gloria Martínez Gómez, Ana Sofía de Agrela Serrao, Claudia Corbalán Ruiz, Ángela Mercedes Leiva Montejo, Tomás Enrique Rodríguez Locarno, María Isabel Castellón Sánchez, Tatiana Moreno Monsalve, María José Ibáñez Ibáñez y José Fulgencio Contreras Gutiérrez*

*Hospital Clínico Virgen de la Arrixaca, Murcia, España.*

### Resumen

**Objetivo:** Realizar una revisión de los pacientes con gammagrafía de perfusión cerebral *in situ* (GPC) entre 2020 y 2023, con el objetivo de diagnosticar muerte encefálica (ME).

**Material y métodos:** estudio retrospectivo, observacional, analítico en el que se seleccionaron 197 pacientes con una GPC entre enero de 2020 y diciembre de 2023, 110 varones y 87 mujeres, con una edad media de  $53,95 \pm 18,37$  años, para confirmar el diagnóstico de ME. Todos con exploración clínica compatible. Se recogieron datos de pruebas adicionales (test de atropina, electroencefalograma y doppler transcraneal) para correlacionar sus resultados con los de la GPC y calcular la sensibilidad y especificidad de nuestra exploración.

**Resultados:** Las etiologías más frecuentes de ME fueron el traumatismo craneoencefálico grave (28,6%), ictus hemorrágico (21,9%), hemorragia subaracnoidea (15,3%), ictus isquémico (14,3%), encefalopatía anóxica (14,3%) e infección del sistema nervioso central (5,6%). Se obtuvieron 183 resultados positivos para ME en la primera GPC. De los 14 pacientes negativos en la primera prueba, 10 resultaron positivos en la segunda exploración y 1 en la tercera. Los 3 restantes fueron diagnosticados de ME por otros métodos diagnósticos. El doppler transcraneal confirmó ME en 57 de 78 pacientes, y el electroencefalograma en 14 de 18. Se observó una relación estadísticamente significativa entre la GPC con la exploración clínica y con el doppler transcraneal ( $p < 0,01$ ). La sensibilidad y especificidad de nuestra exploración en la primera prueba fueron del 92% y del 33% respectivamente al comparar con el primer doppler transcraneal.

**Conclusiones:** la GPC con gammacámara portátil es una exploración accesible y cada vez más empleada para confirmar el diagnóstico precoz de muerte encefálica en pacientes con exploración neurológica compatible.