

Evaluación de la competencia clínica de tutores de residentes de medicina familiar y comunitaria

M. Pedregal González^a, E. Molina Fernández^a, J.A. Prados Castillejo^b, F. Quesada Jiménez^c, P. Bonal Pitz^d y C. Iglesias Arrabal^e

Objetivo. Describir la primera experiencia de una evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOFE) a tutores de residentes realizada en la comunidad autónoma de Andalucía.

Diseño. Observacional descriptivo.

Emplazamiento. Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Huelva.

Participantes. Tutores de residentes de medicina familiar y comunitaria.

Mediciones principales. Los componentes competenciales que se consensuaron y ponderaron fueron los siguientes: anamnesis, exploración física, comunicación, habilidades técnicas, manejo, atención a la familia y actividades preventivas.

La selección de las 10 situaciones clínicas de las que constaba la prueba se realizó utilizando unos criterios de priorización según la prevalencia, gravedad clínica, importancia de la prevención y del diagnóstico precoz, complejidad del caso, evaluación de la capacidad resolutoria del médico y simplicidad evaluativa.

Resultados. Realizaron la ECOFE 13 tutores. La edad media \pm desviación estándar de los participantes fue de $42,8 \pm 3,64$ años. La prueba tuvo un coeficiente de fiabilidad (alfa de Cronbach) de 0,73. Por lo que se refiere a los resultados por participantes, la media global fue de $73 \pm 6,2$. Al analizar los resultados para los diferentes componentes competenciales, los mejores resultados se obtuvieron en la atención a la familia, la comunicación y las habilidades técnicas.

Conclusiones. Las pruebas de evaluación clínica objetiva y estructurada pueden ser útiles para la valoración de los tutores, con el objetivo de orientar su formación en los puntos débiles e incluso para, en un futuro no muy lejano, servir como instrumento para acreditar y reacreditar a los tutores de residentes de medicina familiar y comunitaria.

Palabras clave: Competencia clínica. Tutores de residentes de medicina de familia. Evaluación clínica.

EVALUATION OF CLINICAL COMPETENCE OF FAMILY MEDICINE TRAINER

Objectives. We show the first experience of the application of an objective and structured clinical evaluation (OSCE) procedure to family medicine trainers, that has been carried out in Andalucía. The objective is to use a competence evaluation instrument that, in the short term, will be used not only for trainer accreditation but also for other public sanitary professionals.

Participants. Tutors of family and community medicine residents.

Design. Observational descriptive.

Setting. Educational unity of family medicine.

Principal measurements. The competencial components to be assessed are the following: anamnesis, physical exploration, communication, technical skill, management, family attention and preventive activities.

The clinical situations were selected using the following priority criteria: prevalence, clinical gravity, prevention and early diagnosis importance, case complexity, doctor's capacity of evaluation and simplicity.

Results. Thirteen family medicine trainers took part in the OSCE. Their average age was 42.8 ± 3.6 years. The test had an overall reliability coefficient (Cronbach's alpha) of 0.73. The overall mean score of the participants was 73 ± 6.2 . The best results about the competencial components were family attention, communication and technical skill.

Conclusions. The OSCE can be a convenient tool for family medical trainer evaluation, helping to orientate their education in the weak points and, in the near future, it can also be used as an instrument do accredit family medicine trainers.

Key words: Clinical competence. Family medicine trainer. Clinical evaluation.

English version available at
www.atencionprimaria.com/75.843

A este artículo sigue un comentario editorial (pág. 73)

^aUnidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Huelva. Huelva. España.

^bCentro de Salud Polígono de Guadalquivir. Córdoba. España.

^cCentro de Salud de Cartuja-Almanjáyar. Granada. España.

^dUnidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria. Centro de Salud Universitario de Bellavista. Sevilla. España.

^eCasa del Mar (Instituto Social de la Marina). El Puerto de Santa María. Cádiz. España.

Este trabajo fue financiado por el Hospital Juan Ramón Jiménez.

Correspondencia:
Miguel Pedregal González.
Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Huelva.
Hospital Juan Ramón Jiménez.
Ronda Norte, s/n. 21005 Huelva.
España.

Manuscrito recibido el 24 de octubre de 2003.
Manuscrito aceptado para su publicación el 7 de enero de 2004.

Introducción

Desde hace más de 20 años, la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECO) constituye un método evaluativo que ha sido adoptado por un número creciente de instituciones sanitarias, facultades y sociedades científicas. Su uso es generalizado en la práctica totalidad de países de influencia anglosajona¹. Ya en España, y más concretamente en Cataluña, el Instituto de Estudios de la Salud (IES) de la Generalitat de Catalunya ha realizado proyectos de evaluación desde 1994, tanto en pregrado como en posgrado y en distintas especialidades médicas^{2,3}. Esto ha permitido detectar ciertos déficit en las habilidades asistenciales, tanto de estudiantes como de profesionales, con el fin último de reorientar las actividades de la educación médica⁴. El número de casos clínicos que debe incluir una ECO es el resultado de un compromiso entre validez, fiabilidad y factibilidad. A partir de 10 casos puede obtenerse una buena fiabilidad pero, en general, la mayoría de las ECOs suelen incluir alrededor de 20 casos distribuidos en 30 estaciones⁵.

La especialidad de medicina familiar y comunitaria (MFyC) abarca un amplio campo de conocimientos y habilidades, y los médicos de familia han sido pioneros a la hora de poner en marcha modelos formativos innovadores: implantación del programa de la especialidad, formación continuada, acreditación de actividades de formación o tutorización y evaluación de la formación posgraduada⁶.

Entre las propuestas de criterios para la acreditación y reacreditación de tutores de residentes de MFyC se incluye que el tutor tenga competencia profesional, y para evaluarla se propone la realización de una ECO⁷.


Hay pocas experiencias en la evaluación de la competencia mediante ECO a tutores de residentes de MFyC en España, y ninguna en la comunidad autónoma andaluza. Así, presentamos la primera experiencia realizada en la Unidad Docente (UD) de MFyC de Huelva con el objetivo de utilizar un instrumento de evaluación de la competencia clínica útil para detectar aspectos susceptibles de mejora que sirvan a los tutores para mejorar su formación.

Sujetos y método

En el año 2001 se constituyó el Comité de Prueba (CP) compuesto por 6 médicos de familia con experiencia en la práctica clínica habitual como médicos de atención primaria (AP) en la formación de residentes, como tutores, como docentes en cursos, y con experiencia y conocimientos en la evaluación de competencias. Las funciones del CP consistían en definir los componentes competenciales, el listado y la priorización de las situaciones clínicas, la construcción de la tabla de especificaciones y el diseño de algunos de los casos clínicos.

Material y métodos

Cuadro resumen



Los componentes competenciales que se consensuaron y ponderaron se basaron en las recomendaciones de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària⁸ (en paréntesis se expone el peso de cada componente): anamnesis (12%), exploración física (12%), comunicación (16%), habilidades técnicas (10%), manejo (capacidad del participante para llegar a un diagnóstico correcto mediante la interpretación de datos de anamnesis, exploración y pruebas complementarias, conocimientos sobre tratamientos y capacidad para establecer un plan de seguimiento; 40%), atención a la familia (4%) y actividades preventivas (6%).

La selección de las situaciones clínicas se consensuó utilizando unos criterios de priorización según la prevalencia, gravedad clínica, importancia de la prevención y del diagnóstico precoz, complejidad del caso, evaluación de la capacidad resolutoria del médico y simplicidad evaluativa⁹. Se seleccionaron los instrumentos más adecuados para cada situación clínica: pacientes estandarizados, maniqués, imágenes clínicas, preguntas abiertas de respuesta corta y preguntas de respuesta múltiple. Finalmente, se diseñó la tabla de especificaciones, que combina las competencias a evaluar con los instrumentos y las situaciones clínicas. Dos de los casos clínicos, sus guiones, aplicación práctica y listado evaluativo, así como el asesoramiento desinteresado, fueron aportados por el IES. El resto fue diseñado por el propio CP.

La logística y el análisis psicométrico fueron realizados por el personal de la UD de MFyC.

La prueba estaba compuesta por 10 situaciones clínicas que debían resolverse en 6 minutos cada una. Esta duración corresponde a la realidad actual en cuanto al tiempo medio de las visitas en AP en la comunidad autónoma andaluza. Las situaciones clínicas correspondían a distintas situaciones propias de la AP: urgencias, visitas clínicas y cirugía menor (tabla 1). La prueba se dividió en

TABLA 1
Estaciones e instrumentos utilizados

N.º estación	Nombre del caso	Tipo de estación
1	Lumbalgia	Paciente estandarizado
2	Diabetes	Preguntas de respuesta múltiple
3	Dolor torácico	Paciente estandarizado
4	RCP básica	Maniquí
5	EPOC	Paciente estandarizado
6	Mancha de la piel	Imagen + preguntas abiertas
7	Depresión	Paciente estandarizado
8	Palpitaciones	Imagen + preguntas abiertas
9	Cefalea	Paciente estandarizado
10	Cirugía menor	Maniquí

REC: reanimación cardiopulmonar; EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

2 grupos de estaciones (ruedas), sin incluir descansos. La duración total de la prueba fue de 104 minutos.

La ECOE se realizó en el centro de salud La Orden de Huelva el 16 de mayo de 2003. Se eligió este centro por que cumplía los requisitos estructurales necesarios para una prueba de estas características.

La condición para participar era ser tutor de residentes de la UD de MFyC de Huelva, y la participación fue voluntaria. Intervinieron en la prueba 5 pacientes estandarizados, 7 observadores y 3 personas encargadas de la logística.

El número de 10 estaciones se estableció sobre la base de los recursos disponibles y se consideró que era el número mínimo para obtener una buena fiabilidad.

Cada caso puntuaba un máximo de 100 puntos, repartidos entre los diferentes componentes que se evaluaban. La puntuación total de la prueba era la media de las puntuaciones de cada caso. Al final de la prueba se administró a los participantes un cuestionario de evaluación para conocer su opinión y sus sensaciones durante el transcurso de la evaluación.

El análisis de los datos se realizó mediante el programa SPSS 11.0. Se analizó la fiabilidad global y por componentes competenciales de la prueba mediante el estadístico alfa de Cronbach. Se estudió la correlación entre la edad de los participantes y los años dedicados a la tutorización con las puntuaciones obtenidas mediante el coeficiente de correlación de Pearson. Se calcularon los resultados por componente competencial para cada uno de los participantes, así como la media y la desviación típica de dichos resultados. También se calcularon los resultados por casos. Finalmente, se analizaron los resultados de la evaluación realizada por los participantes.

Resultados

Realizaron la prueba 13 de los 22 tutores acreditados en la UD (8 varones y 5 mujeres). La edad media \pm desviación estándar (DE) de los participantes fue de $42,8 \pm 3,6$ años y la media de años dedicados a la tutorización de residentes fue de $8,6 \pm 4,6$ años. De los 9 que no participaron (4 varones y 5 mujeres), 8 adujeron razones personales (la

TABLA 2
Alfa de Cronbach por componentes competenciales

Componente competencial	Alfa de Cronbach
Actividades preventivas	0,7921
Comunicación	0,6453
Habilidades técnicas	0,6277
Atención familiar	0,5637
Anamnesis	0,5443
Exploración física	0,4007
Manejo	0,2987
Global	0,7287

prueba se realizó un viernes por la tarde) y una mujer se encontraba de descanso maternal. La edad media de los no participantes fue de $41,2 \pm 2,4$ años y la media de años dedicados a la tutorización de residentes fue de $4,4 \pm 2,9$ años. No se encontraron diferencias significativas en cuanto a la edad entre los tutores participantes y no participantes en la ECOE ($p = 0,27$). Sí las hubo en cuanto a los años dedicados a la tutorización ($p = 0,03$).

La prueba tuvo un coeficiente de fiabilidad global (alfa de Cronbach) de 0,7287. Por componentes competenciales, los mejores resultados se obtuvieron con los ítems de actividades preventivas, comunicación y habilidades técnicas (tabla 2).

Por lo que se refiere a los resultados por participantes, la media global fue de $73 \pm 6,2$ puntos, con un rango de 64,4-81,9 puntos y una amplitud intercuartil de 11,7 (fig. 1).

Al analizar las puntuaciones obtenidas en los diferentes componentes competenciales (tabla 3), los mejores resultados se obtuvieron en la atención a la familia, las habilidades técnicas y la comunicación. Los peores resultados se encuentran en las actividades preventivas y la exploración




FIGURA 1
Distribución de la puntuación por casos de los tutores.

TABLA 3 Resultados por componentes competenciales

Componente competencial	Media	Desviación estándar
Actividades preventivas	61,53	29,95
Exploración física	65,76	10,96
Anamnesis	70,44	16,76
Manejo	71,61	10,11
Comunicación	80,71	7,68
Habilidades técnicas	81,07	15,21
Atención a la familia	84,23	23,01

TABLA 4 Resultados por casos

N.º de caso	Media	Desviación estándar
1	59,77	7,25
2	92,62	14,03
3	74	11,69
4	56,54	28,53
5	43,15	25,61
6	73,85	13,40
7	80,15	10,84
8	78,46	22,30
9	85,38	10,50
10	84,54	14,08

física. Entre ellos se incluyen la anamnesis y el manejo de los pacientes. En la tabla 4 se reflejan los resultados por casos, utilizando la media y la desviación estándar.

Tanto las puntuaciones de los participantes como la edad y los años de tutor se distribuían normalmente (prueba de Shapiro-Wilk). Se analizó la correlación mediante el coeficiente de correlación de Pearson entre las puntuaciones de cada tutor, los años de tutor y la edad de los participantes. En los dos casos los resultados fueron estadísticamente no significativos, sin que en esta ocasión se encontrara una correlación entre las citadas variables.

En cuanto a las evaluaciones realizadas por los participantes, la mayoría (10 de los 13 tutores) estaba bastante o totalmente de acuerdo en que la prueba y el tiempo dedicado a cada estación se ajustaban a la realidad. Lo mismo ocurría con la opinión sobre el diseño de las estaciones y la interpretación de los casos, así como sobre que este tipo de pruebas ayudaría a mejorar la docencia con residentes. Finalmente, el acuerdo era absoluto en cuanto a que este tipo de pruebas medía mejor la capacidad profesional que las clásicas pruebas escritas. La evaluación abierta evidenció el aspecto emocional de la ECOE: «estaba de los nervios», «me he sentido muy forzado y algo nervioso», «ten-

go mi autoestima por los suelos», «me ha gustado mucho», «globalmente me he sentido bien» y «me lo he pasado muy bien».

Discusión

La fiabilidad es el coeficiente psicométrico más documentado en las evaluaciones que utilizan a pacientes simulados. Se define como el índice que mide la reproducibilidad del proceso en sucesivas repeticiones¹⁰. Es a partir de 10 casos cuando se puede obtener una buena fiabilidad. En este caso, el valor alfa de Cronbach se encuentra en la línea del obtenido en otras experiencias². Al observar los resultados globales por componentes competenciales, podemos afirmar que son satisfactorios. Sin embargo, sorprende comprobar que el que obtiene la media más baja es el componente referido a actividades preventivas, aunque la DE es grande, lo que refleja una gran dispersión de resultados. De todas maneras, sería un componente a mejorar. La segunda puntuación más baja corresponde al componente de exploración física. Puede reflejar que con el paso de los años se van perdiendo habilidades en este sen-

Discusión
Cuadro resumen



Lo conocido sobre el tema

- Desde hace más de 20 años, la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOE) constituye un método evaluativo que ha sido adoptado por un número creciente de instituciones sanitarias.
- El Instituto de Estudios de la Salud (IES) de la Generalitat de Catalunya ha realizado proyectos de evaluación desde 1994, tanto en pregrado como en posgrado y en distintas especialidades médicas.
- Hay pocas experiencias en la evaluación de la competencia mediante ECOE a tutores de residentes de medicina familiar y comunitaria.

Qué aporta este estudio

- El valor de alfa de Cronbach de la prueba fue de 0,7287, en la línea con el de experiencias precedentes.
- Con respecto a los resultados por participantes, la media global fue de $73 \pm 6,17$, con un rango de 64,4-81,9.
- Los mejores resultados, al analizar los componentes competenciales, se obtienen en atención a la familia, comunicación y habilidades técnicas.

tido, probablemente debido a la presión asistencial, que hace que se simplifiquen determinadas maniobras exploratorias. Por el contrario, las puntuaciones más altas corresponden a la atención a la familia (aunque su peso en esta ECOE ha sido pequeño), a la comunicación y a las habilidades técnicas, lo que refleja un cuidado especial de estos componentes por parte de los profesionales y, quizá también, el interés de la UD en la formación de los tutores en estos campos.

En cuanto a los resultados por casos, destaca que las puntuaciones más bajas y las de mayor dispersión se encuentren en los casos 4 (reanimación cardiopulmonar básica) y 5 (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). En cuanto al resultado del caso 4, la explicación puede deberse a que únicamente 4 de los tutores evaluados trabajan en centros de salud rurales en los que se realiza atención continuada (guardias), lo que les obliga a tener más actualizada la formación en soporte vital básico. En el caso 5, el mayor peso recaía sobre el componente competencial de actividades preventivas, en el que se debía hacer un consejo breve para la cesación del hábito tabáquico: un olvido bajaba mucho la puntuación. El estrés que supone una prueba de estas características y el escaso tiempo disponible para cada caso (aunque bastante cercano al real) podrían explicar este resultado. De todas maneras, creemos que los resultados se pueden considerar buenos en la puntuación del resto de los casos y también de manera global.

En general, la aceptación de la prueba ha sido buena, aunque algunos tutores reflejaron en la evaluación algo de nerviosismo; incluso, uno de ellos señaló una afección de su autoestima.

Según los resultados, el esfuerzo de la UD de MFyC tendrá que ir dirigido a mejorar los componentes competenciales con peores resultados. Se intentará la formación en la realización de actividades preventivas (insistiendo en la administración de consejos y otros aspectos de la entrevista motivacional). También se debería mejorar la exploración física utilizando instrumentos adecuados para la formación en este sentido (talleres, CD, pacientes estandarizados, videograbaciones con pacientes reales). Esto, probablemente, redundaría en una mejor formación de los residentes.

Las pruebas de evaluación clínica objetiva y estructurada pueden ser útiles para la evaluación de tutores, con el ob-

jetivo de orientar su formación en los puntos débiles e incluso para, en un futuro no muy lejano, servir como instrumento para acreditar y reacreditar a los tutores de residentes de MFyC.

Agradecimiento

Al comité de prueba, a los tutores que voluntariamente participaron, a Milagros Villamarín Casal por su dedicación, a Juan Pedro Moreno García y al distrito sanitario Huelva-Costa por las facilidades dadas, y a José Luis Sánchez Ramos por sus sabios consejos.

Bibliografía

1. Blay Pueyo C. Evaluación clínica objetiva y estructurada: ECOE. *Educación Médica* 1998;1:13-6.
2. Ruiz i Gil E, Florensa i Claramunt E, Cots i Yago JM, Sellares Salas J, Iruela López A, Blay Pueyo C, et al. Primeras experiencias en evaluación de la competencia clínica de los médicos de familia de Catalunya. *Aten Primaria* 2001;28:105-9.
3. Cervera Alemany AM, Cervera Alemany AM, Salvà Casanovas A, Altimir Losada S, Miralle Basseda R, Yuste Marco A, Blay Pueyo C, et al. Evaluación clínica objetiva y estructurada en geriatría. Resultados del primer proyecto realizado en España. *Rev Esp Geriatr Gerontol* 2002;37:298-303.
4. Martínez Carretero JM, Blay Pueyo C. Evaluando la competencia de los profesionales sanitarios: dudas fundamentos y experiencias. *Educación Médica* 1998;1:17-23.
5. Colliver JA, Vu NV, Barrows H. Screening test length for sequential testing for a SP examination: a receiver operating characteristic (ROC) analysis. *Acad Med* 1992;67:592-5.
6. Sellares Sallas J, Cots Yago JM. ¿Debemos evaluar la competencia de los médicos de familia? *Aten Primaria* 2002;30:539-40.
7. Gómez Gascón T. Acreditación y reacreditación de tutores de MFyC en España. *Aten Primaria* 2002;29:164-6.
8. Blay C, Cordón F, Cots JM, Ezquerro M, Florensa E, Forés D, et al. Certificació-recertificació de la competència professional dels metges d'atenció primària. *Butlletí Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària* 1996;63:9-16.
9. Sellarés J, Bosch C, Florensa E, De Serdio E, Gorroñoigoitia A, Medina E, et al. Evaluación de la competencia: reto y necesidad. Barcelona: semFYC, 2002.
10. Colliver J, Williams R. Technical issues: test application. *Acad Med* 1993;68:454-60.

COMENTARIO EDITORIAL

Los límites de la evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOFE)

C. Blay

Médico de Familia. ICS ABS Santa Eugènia de Berga. Berga. España. Unitat Avaluació Competència Clínica. Institut d'Estudis de la Salut. Barcelona. España.

Como se anunciaba en los años 1990¹, la competencia de los profesionales sanitarios (y el modo en que ésta puede y debe ser evaluada) se encuentra ya en los foros médicos de discusión. Diversas iniciativas institucionales, legislativas y científicas han puesto de relevancia que nuestro entorno no es ajeno al debate que sobre el profesionalismo se está produciendo en todo el mundo. En consecuencia, el número de proyectos que en nuestro país pretenden evaluar la competencia clínica de los médicos es cada vez mayor y más relevante.

El excelente artículo sobre el que se basa este comentario editorial ilustra perfectamente este fenómeno. Y lo hace en un doble sentido: por un lado, refleja el rigor metodológico que debemos exigir a cualquier proyecto de evaluación de la competencia profesional (ECP) y, por otro, muestra los límites, paradojas y núcleos de progreso propios de la ECP, temas que, a continuación, pretendemos esbozar.

Estableciendo la bases estratégicas

Todo proyecto evaluativo debe establecer inequívocamente sus bases estratégicas. Ello supone especificar *a quién* va dirigida la prueba, *qué nivel de exigencia* tendrá y, por encima de todo, *cuál es la finalidad* de la evaluación. De las respuestas dependerán la estructura y los contenidos evaluativos.

El complejo constructo que es la *competencia profesional* precisa un formato evaluativo distinto según la ideología de cada proyecto². Y cada formato evaluativo tiene sus indicaciones específicas. Una evaluación clínica objetiva y estructurada (ECOFE) no sirve para cualquier intención evaluativa.

Evaluación formativa frente a evaluación sumativa

Lo antedicho se hace especialmente patente cuando la disyuntiva se plantea entre una evaluación que pretende certificar la competencia (sumativa) o cuando pretende orientar la formación de los individuos (formativa).

Cuando la voluntad es sumativa, la fiabilidad de la prueba, así como su validez predictiva y de constructo, son ítems absolutamente cruciales. Cuando la voluntad es formativa,

Puntos clave

- El actual debate sobre el profesionalismo conlleva la generalización de modelos de evaluación de la competencia de los profesionales.
- La ECOFE ha demostrado ser un excelente método de certificación de competencia, pero su capacidad de generar *feedback* formativo es limitada.
- Es peor evaluar mal que no evaluar.

es en el impacto educativo del formato, así como en su validez de contenidos, donde deben centrarse los esfuerzos de verificación.

Una ECOFE de sólo 10 estaciones podría ser un buen instrumento de certificación sumativa pero, por fiable que sea, está limitada para dar un *feedback* formativo de calidad (entendiendo como «de calidad» el *feedback* que es cierto, completo y útil para el individuo).

Interpretando adecuadamente los parámetros psicométricos

Uno de los riesgos de la ECP es la banalización de los aspectos estadísticos relacionados. Con frecuencia, la fiabilidad (entendida como la consistencia interna y medida mediante el valor del alfa de Cronbach) constituye el núcleo argumental de la bondad métrica de una evaluación. Si bien la fiabilidad es un ítem crucial en proyectos de voluntad certificadora, permitánnos una serie de breves comentarios a este respecto:

1. Con cierta frecuencia, especialmente en proyectos con un número reducido de participantes, el valor del parámetro alfa está artefactado y resulta falsamente alto. De ser así, de una prueba en apariencia fiable podrían derivarse decisiones injustas.

2. Tan importante como la fiabilidad es la validez. Extraer conclusiones, especialmente sumativas sin haber *validado*

el prototipo evaluativo es, con toda seguridad, incorrecto e injusto para los profesionales evaluados.

3. Cuando la intención es proveer *feedback* a los evaluados según su perfil competencial es necesario saber hasta qué punto los componentes competenciales se comportan también de modo fiable y, en general, ello no sucede en una ECOE de pequeño formato.

Para qué sirve una ECOE

La ECOE es un formato evaluativo más. Uno más entre las posibles, adecuadas combinaciones de instrumentos evaluativos. A pesar de ser la ECOE el paradigma de la evaluación de la práctica clínica en entornos de simulación, en absoluto es una estructura omnipotencial.

La ECOE es un excelente medio para certificar la competencia de los profesionales (sobre todo para detectar a aquellos cuya práctica es claramente inadecuada). También tiene capacidad para proveer cierto *feedback* competencial del colectivo evaluado.

Pero, en general, su capacidad para dar *feedback* formativo a los individuos se reduce a los resultados globales («como estoy de nota global en relación al grupo»), y es insuficiente para caracterizar el perfil de práctica de los individuos evaluados. Como *feedback* formativo, es mucho más poderosa la reflexión sobre «qué he sentido mientras se pasaba la ECOE» que «qué notas he sacado en cada componente competencial».

La competencia del profesional experto

La competencia es un fenómeno dinámico³ que cambia y se expresa de modo muy distinto a medida que los profesio-

sionales adquieren experiencia. Dos profesionales experimentados pueden ser igual de competentes y tomar decisiones igualmente correctas ante una determinada situación, utilizando caminos del todo diferentes.

La competencia profesional, además, va más allá de la pericia clínica. El mundo afectivo y moral, así como aspectos relacionados con las actitudes profesionales, representan componentes competenciales *mayores* en el profesional experto.

Por ello, la evaluación del profesional experimentado es mucho más compleja que la del médico júnior y exige una combinación mayor y más refinada de instrumentos evaluativos.

La evaluación a profesionales sólo cobra sentido cuando ésta es cierta, justa y útil en términos de toma de decisiones competenciales, de reflexión individual y de motivación para mejorar. Nada puede ser más contrario a este fin que la utilización inadecuada de los instrumentos de evaluación.

En un entorno de creciente presencia de estos instrumentos, esforcémonos en darles un buen uso. Por el bien de la profesión.

Bibliografía

1. Blay C. Evaluación de la competencia profesional: ¿están cambiando los tiempos? *Aten Primaria* 1995;16:2-4.
2. Newble D, Jolly B, Wakeford R. The certification and recertification of doctors: issues in the assessment of clinical competence. Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
3. Epstein RM, Hundert EM. Defining and assessing professional competence. *JAMA* 2002;287:226-35.