

Champú T/Gel

Neutrógena amplia su gama de champús con la especialidad farmacéutica *Champú T/Gel*, el champú anticaspa que contiene breva de hulla y que está indicado para el alivio sintomático de las alteraciones capilares descamativas, tales como dermatitis, psoriasis, dermatitis seborreica y caspa del cuero cabelludo. La breva de hulla reduce el grosor de la epidermis y tiene propiedades antimicóticas, de forma que es eficaz incluso para la caspa más rebelde y los picores y molestias en el cuero cabelludo.

Champú T/Gel
Frasco de plástico con
cápsula de 250 ml
CN 896936



Effaclar A.I., corrector localizado de las erupciones cutáneas

El 36% de las mujeres entre 20 y 40 años presentan repetidos e inesperados brotes de imperfecciones localizadas. *Effaclar A.I.*, de La Roche-Posay, es un corrector localizado de las erupciones cutáneas indicado, un tratamiento local intensivo que purifica las imperfecciones profundamente para acelerar su reabsorción y prevenir las marcas residuales.



Effaclar A.I. está indicado en las personas con brotes de imperfecciones localizadas súbitos o recurrentes, así como en las personas que buscan un tratamiento local que purifique profundamente la imperfección.

Con *Effaclar A.I.* la piel se vuelve perfectamente homogénea en su superficie, sin marcas residuales.

Effaclar A.I.
Envase de 15 ml
CN 330381


Alercina, para el tratamiento de los procesos alérgicos

Según estudios recientemente publicados, la rinitis por alergia al polen afecta a un 15-20% de la población española, aproximadamente 8 millones de personas.

Laboratorios Cinfa ha puesto a disposición de los profesionales sanitarios una nueva especialidad farmacéutica publicitaria (EFP): *Alercina*. Esta nueva EFP es un antihistamínico que contiene como único principio activo cetirizina (10 mg) y está indicada para aliviar los síntomas asociados a los procesos alérgicos, tales como goteo nasal, estornudos, picor de nariz y garganta, irritación de los ojos y picor de piel.

Alercina
Envase de 7 comprimidos de 10 mg
CN 703744

Alercina consigue aliviar durante 24 h estos síntomas y presenta, además, una ventaja adicional frente a los antihistamínicos de primera generación: no produce somnolencia.



Tanit Despigmante para Manos



Las manchas oscuras en las manos son un signo inequívoco de la edad. Laboratorios Viñas lanza la nueva crema *Tanit Despigmante para Manos*, específicamente formulada para actuar contra las manchas de las manos.

A diferencia de otras cremas antiedad, *Tanit Despigmante para Manos* elimina las manchas ya existentes gracias a la acción conjunta de dos agentes despigmentantes (kójico dipalmitato y arbutina), al mismo tiempo que impide la aparición de nuevas manchas gracias a sus filtros solares UVA y UVB.

Tanit Despigmante para Manos
 Tubo de 50 ml
 CN 161836

Este producto se usa a diario como única crema de manos, ya que contiene escualano y áloe vera, sustancias que reparan y protegen la superficie de la piel.

Crisomet, para la prevención de los episodios depresivos en pacientes con trastorno bipolar

Crisomet (lamotrigina), de Laboratorios Juste, acaba de obtener la aprobación para la prevención de los episodios depresivos en pacientes con trastorno bipolar.

Crisomet
 Envase de 56 comprimidos dispersables de 25 mg
 CN 845875

A partir de ahora, *Crisomet* permitirá proteger eficazmente al paciente de la fase depresiva del trastorno bipolar con altos beneficios terapéuticos y una buena tolerancia, lo que le hace ser una mejor alternativa al litio que los anticonvulsivos clásicos debido a su menor toxicidad. Según los estudios realizados, *Crisomet* actúa a largo plazo retrasando las recaídas y recurrencias de los episodios depresivos, sin incrementar el riesgo de ciclación o viraje a manía, y sin deteriorar la función psicomotora ni de la memoria.



Hemofarm Plus, toallitas para aliviar las hemorroides

Las toallitas higiénicas *Hemofarm Plus* permiten una limpieza suave, calmante, refrescante y no irritante después de cada evacuación. Su composición les confiere propiedades emolientes que ayudan a calmar la irritación, a aliviar el dolor y a prevenir posibles infecciones que provocan las hemorroides. Gracias a la suavidad de su tejido, los especialistas recomiendan su utilización en lugar del papel higiénico, que puede resultar demasiado agresivo.

Hemofarm Plus
 Bolsa con 40 toallitas
 CN 236786

Hemofarm Plus se presenta en bolsas de plástico que contienen 40 toallitas húmedas con un sistema de apertura que facilita su extracción. Además, el diseño del envase permite que las toallitas se conserven perfectamente húmedas hasta su aplicación.



Nueva gama Sebamed Clear Face

Laboratorios Leti lanza al mercado la nueva gama Sebamed Clear Face para el cuidado diario de la piel grasa o con tendencia acnéica. Se trata de una gama de productos específicos para la higiene y el tratamiento localizado de los granos. Su máximo objetivo es aportar toda la efectividad en la piel, pero respetando al máximo su equilibrio y función protectora.

Los productos de la gama son:

- **Pastilla limpiadora.** Elimina y controla el exceso de grasa, que taponan los poros, evitando así la aparición de puntos negros y espinillas inflamadas.
- **Espuma limpiadora antibacteriana.** Limpia profundamente la piel, eliminando la grasa. Asimismo, frena el crecimiento de las bacterias que causan el acné, evitando la inflamación y el enrojecimiento.
- **Gel antiespinillas.** Es un tratamiento localizado contra los granos con acción secante.
- **Crema con color antiespinillas.** Se trata de un tratamiento localizado contra los granos con acción secante. Disimula y cubre el enrojecimiento con un tono similar a la piel.



Pastilla limpiadora
 Pastilla de 100 g
 CN 178434

Gel antiespinillas
 Tubo 10 ml
 CN 204008

Espuma limpiadora antibacteriana
 Botella dosificadora de 150 ml
 CN 204016

Crema con color antiespinillas
 Tubo 10 ml
 CN 178442



Promoción Mepentol

Laboratorios Bama-Geve ha calificado de gran éxito la promoción de Mepentol, realizada a través de nuestra revista: se han recibido cerca de 1.500 respuestas y en un 85% de los casos el farmacéutico desconocía que Mepentol es el producto más novedoso del mercado para la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión de grado I.

Todas las farmacias que han contestado han sido incluidas en el sorteo de un pesabebés Davibaby. El sorteo se realizó el 12 de julio de 2004 ante notario. La farmacia ganadora fue: Farmacia Espuñes González, de la calle Porrera 21 de Barcelona.

El interés mostrado por los farmacéuticos de toda España confirma que las úlceras por presión son un importante problema de salud en nuestro país.

Mepentol
 Frasco pulverizador de 20 ml
 CN 247205

Mepentol
 Frasco pulverizador de 60 ml
 CN 214122

Novedades de Laboratorios OTC Ibérica



- *Efluvium Cistina Capsulas*. Indicada para aportar al organismo carencial los elementos necesarios para el desarrollo normal del cabello y la formación de la llamada queratina dura que estructura uñas y cabello. Se presenta en forma de cápsulas de gelatina dura que permiten una alta y exacta dosificación de principios activos, neutralizando las condiciones organolépticas de los componentes y facilitando la ingestión.
- *Rebladerm 30% Spray*. Especialmente indicada para facilitar su aplicación en podología. Consigue una excelente acción queratolítica para el cuidado de las zonas cutáneas engrosadas por diferentes causas.
- *Crema Laser Extrahidratante OTC*. A partir de ahora, esta crema se comercializa en una atractiva presentación práctica y actual. El nuevo envase es un tubo de 100 ml con tapón bisagra que facilita su apertura y cierre, se ha mantenido el diseño gráfico y el color rojo característico del producto y reconocido por los clientes.

- Esta crema ha sido formulada para conseguir una hidratación profunda de la piel seca o dañada, ya sea por causas naturales o agresiones externas como radioterapia o UVA.
- *Repavar Gel*. Se trata de un aceite de rosa mosqueta gelificado, con una concentración de 30% de principio activo natural, estabilizado y enriquecido con bisabolol y vitamina E. Está indicado para las pequeñas erosiones, irritaciones y cicatrices de la cara.

Efluvium Cistina Cápsulas
 Estuche 60 cápsulas
 CN 352823

Crema Laser Extrahidratante
 Tubo de 100 ml
 CN 368316

Rebladerm Spray
 Tubo de 125 ml
 CN 372177

Repavar Gel
 Tubo de plástico con cánula
 aplicadora de 30 ml
 CN 372193

Nueva línea de cuidados Fioravanti



Para un brillo extremo, René Furterer propone la línea de cuidados Fioravanti, adaptada a la naturaleza del cabello.

Se trata de una línea completa que, además del brillo, responde a los problemas de falta de volumen, de desenredo difícil o de rizos rebeldes. Desde ahora, René Furterer aporta una respuesta completa para el alisado y el control de la cabellera con los siguientes productos:

- **Champú Suavizante Brillo Extremo.** Ayuda a controlar la cabellera y le proporciona flexibilidad y brillo para un acabado liso y perfecto durante el cepillado. De uso frecuente, lava con suavidad y alisa las fibras queratínicas debido a las ceras microemulsionadas que se funden con la materia del cabello y rellenan las brechas intracuticulares. Las escamas se alisan, la superficie del cabello es más homogénea, los cabellos no se enredan y se peinan fácilmente.
- **Bálsamo Disciplinante Brillo extremo.** De fácil y rápida aplicación, este bálsamo desenreda el cabello e intensifica la acción del champú suavizante. Deja la cabellera perfectamente desenredada, lisa y sin encredado. Protege también del calor del secador. Es antiestático y antihumedad para una acción prolongada.

Champú suavizante Brillo Extremo
Tubo transparente de 150 ml
CN 323402

Bálsamo Disciplinante Brillo extremo
Tubo transparente de 150 ml
CN 323147

Novedades Sunstar



- **Cepillo Eléctrico Garfield a Pilas.** Tres divertidos colores, naranja, violeta y pistacho para hacer las delicias de los más pequeños con el gato Garfield. Está incluido un soporte, con divertidas imágenes de Garfield.
- **Gel Dentífrico Garfield 75 ml.** Nueva imagen y diseño del Gel Infantil Garfield de 75 ml de capacidad. Sabor *tutti frutti* especialmente diseñado para los niños.
- **Limpiador Lingual de Doble Acción Contra la Halitosis.** Es el único producto que ofrece la posibilidad de raspar y de limpiar en un mismo producto, y, por tanto, elimina eficazmente las bacterias del dorso de la lengua. Una cara tiene dos hileras de filamentos para cepillar los restos de partículas alimenticias y bacterias depositadas en la lengua. La otra cara posee dos filas de polipropileno en forma de sierra para raspar y eliminar las bacterias de la superficie irregular de la lengua. El mango del limpiador lingual es ergonómico y largo, especialmente diseñado para una buena manipulación y eliminación de bacterias.

Tellermate TD, para el arqueo de caja diario

A rifarm Business pone al alcance de todos los establecimientos farmacéuticos españoles lo último en contadores de dinero electrónicos: *Tellermate TD*. Para quienes necesitan contar dinero metálico día tras día, la nueva *Tellermate TD* está demostrando ser el mejor invento desde la calculadora de bolsillo, gracias a que responde eficazmente a la necesidad de mejorar radicalmente las operaciones de manipulación de dinero. Este gran invento se distingue no sólo por su exactitud y su conveniente sistema de voz, que brinda rapidez y facilidad de uso, sino también por ser comercializado a un precio muy asequible.

Tellermate TD cuenta y suma billetes y monedas (sueltas, en bolsas o en cilindros) para el arqueo de caja diario. No hay necesidad de cotejar o volver a contar: con una sola vez basta. Incorpora la tecnología probada de *Tellermate*, la misma que utilizan los bancos y los comercios de todo el mundo.



Flash Mints

CARAMELO EN LÁMINA SIN AZÚCAR

Anunciado en TV.

FlashMints Limón

UNA MARCA EXCLUSIVA PARA LA FARMACIA



+ vitamina C

¡EL ORIGINAL!

¿Por qué las láminas FlashMints son las mejores del mundo?

- 1 Porque no se pegan al paladar.
- 2 Porque se disuelven con mayor facilidad.
- 3 Porque tienen mayor sabor, más agradable y prolongado.
- 4 PORQUE SU FÓRMULA FUE LA PRIMERA Y ORIGINAL.

Características

- . Elimina el mal aliento
- . Refresca la boca
- . Excelente calidad

Presentación

- . Expositor 48 estuches
- . Expositor antirrobo
- . Material: plástico rígido

CADA ESTUCHE CONTIENE 24 LÁMINAS

FlashMints Menta

UNA MARCA EXCLUSIVA PARA LA FARMACIA



Primavia Crema Decontracturante Antiarrugas



Las arrugas de expresión representan uno de los primeros signos de envejecimiento de la piel. Su causa principal es la repetida contracción de los músculos faciales al gesticular, reír, etc.

Primavia Crema Decontracturante Antiarrugas
 Tubo de 40 ml
 CN 235747

Con el objetivo de prevenir y combatir la formación de arrugas y marcas de expresión, Dermathea, especialista en la prevención y tratamiento del envejecimiento cutáneo, ha formulado *Primavia*.

Primavia Crema Decontracturante Antiarrugas es una novedosa fórmula que reúne una serie de principios de reconocida acción frente al envejecimiento cutáneo. Además, está formulada con una base de alta tolerancia, de fácil penetración y un excelente resultado cosmético.

Spiraxin, contra las enfermedades intestinales de origen bacteriano

Laboratorios Bama-Geve lanza al mercado español *Spiraxin* (rifaximina), un antibiótico tóxico de amplio espectro exclusivo para las enfermedades intestinales de etiología bacteriana.

Spiraxin
 Envase de 12 comprimidos recubiertos
 CN 656645

En infecciones intestinales bacterianas, *Spiraxin* se concentra en el espacio luminal del intestino, de manera que actúa sobre las principales bacterias grampositivas y gramnegativas, aerobias y anaerobias del tracto gastrointestinal, mejorando así el cuadro sintomatológico desde el primer día. *Spiraxin* también ha demostrado reducir los síntomas típicos de la diverticulosis sintomática, inhibiendo el sobrecrecimiento bacteriano.

Spiraxin tiene una acción intestinal asegurada, porque no se absorbe a nivel sistémico tras su administración oral, por lo que consigue un excelente perfil de seguridad.



Varicid, tratamiento de las piernas varicosas



Varicid es un venotónico oral, en forma de comprimidos de liberación prolongada, indicado para el alivio temporal de los síntomas relacionados con la insuficiencia venosa leve de las extremidades inferiores, tales como dolores, sensación de pesadez, hormigueo, calambres nocturnos y prurito en piernas con varices. Este producto refuerza la pared venosa y capilar, disminuye la permeabilidad vascular, rebaja el edema y mejora la velocidad del flujo venoso.

Varicid se ha demostrado claramente eficaz en los síntomas de insuficiencia venosa crónica, con un excelente perfil de seguridad y una favorable percepción por parte del paciente en la mejoría de su calidad de vida.

Varicid
 Caja con 50 comprimidos
 CN 751529

Nuevo *Oraldine Menta*



Oraldine Menta
 Envase de 100 ml
 CN 265090

Oraldine Menta
 Envase de 200 ml
 CN 210427

Oraldine Menta
 Envase de 400 ml
 CN 210435


El envejecimiento de las encías y la pérdida de dientes pueden evitarse con la adquisición de unos hábitos de higiene bucal correctos y, a diferencia de las creencias populares, no está relacionado con la edad de los individuos. Este envejecimiento se manifiesta con la aparición de enfermedades periodontales como la gingivitis o la periodontitis.

El nuevo *Oraldine Menta* es un colutorio con hexetidina (0,1%) que retrasa el envejecimiento de las encías, porque reduce la placa bacteriana en un 33,5%. Después del cepillado, *Oraldine Menta* consigue inhibir el crecimiento de microorganismos en la boca y asegura una total higiene y desinfección. De esta manera, fortalece las encías y consigue retrasar su envejecimiento, asegurando una dentadura sana para toda la vida.

CabyMar Nutracéutico

El biotec (Grupo EuroEspes) lanza al mercado nacional e internacional *CabyMar Nutracéutico*, con lipoproteínas naturales de origen marino que se obtienen mediante procesos biotecnológicos no desnaturalizantes que preservan todas las propiedades biológicas de la especie marina original, *S. scombrus* (E-CAB-94011), un pescado azul de la familia de la caballa. Las excelentes propiedades de este pescado azul hacen que *CabyMar Nutracéutico* aporte una gran ayuda al funcionamiento fisiológico de nuestro organismo en situaciones de cuidados especiales de la dieta y en casos en que se requiera un aporte nutricional complementario. Presenta un alto contenido en proteínas, muy bajo contenido en lípidos y carece de hidratos de carbono, por lo que su aporte energético es ideal para una dieta óptima, especialmente en niños y personas mayores.

CabyMar
Nutracéutico
 Envases de
 30 cápsulas



Mascarilla Reparación Intensa al Extracto de Granada

Laboratorios Klorane completa la gama capilar para cabellos teñidos al extracto de granada con la nueva *Mascarilla Reparación Intensa al Extracto de Granada*.

Particularmente enriquecida, esta mascarilla nutre y reestructura profundamente los cabellos dañados por la coloración y, además, permite prolongar y sublimar el color. De textura rica y cremosa, ligeramente rosada, la *Mascarilla Reparación Intensa al Extracto de Granada* es un tratamiento dirigido a los cabellos dañados por las coloraciones.

Mascarilla Reparación
Intensa al Extracto
de Granada
 Tarro de 150 ml
 CN 266189

Neostrata Gel Forte Salicílico



Industrial Farmacéutica Cantabria amplía su línea dermatológica lanzando al mercado farmacéutico español *Neostrata Gel Forte Salicílico*, el primer cuidado tópico para pieles acnéicas que combina las máximas concentraciones de ácido glicólico y ácido salicílico. Este nuevo gel desbloquea el folículo pilosebáceo, normaliza la secreción sebácea, favorece la penetración de otros agentes terapéuticos y disminuye las lesiones residuales del acné, dejando la piel hidratada y suave.

Neostrata Gel Forte Salicílico
Envase de 100 ml
CN 213017

Neostrata Gel Forte Salicílico está indicado en el cuidado de pieles acnéicas y sus secuelas, como hiperpigmentaciones postinflamatorias, cicatrices acnéicas, etc.

Anticelulítica Babé

Laboratorios Babé, especializados en cuidado y salud de la piel, cuenta con una línea cosmética que da respuesta a problemas básicos de la piel. Dentro de esta línea corporal se presenta la crema *Anticelulítica Babé*, recomendada para tratamiento y prevención de la celulitis. Actúa específicamente favoreciendo la microcirculación y evitando y disminuyendo las acumulaciones acuosas y grasas. Asimismo, posee propiedades liporreductoras, lipolíticas y reafirmantes. Con un pH de 5,5, está especialmente indicada en situaciones de sedentarismo, obesidad, embarazo y realización de dietas. Se recomienda un tratamiento mínimo de 3 meses, durante el cual se deberá cuidar la dieta y realizar ejercicios físicos.

Anticelulítica Babé
Tarro de 200 ml
CN 181743



Ampliación de la gama Protient Lift



La gama Protient Lift, de RoC, incorpora los siguientes productos:

- *Protient Lift Día*. Es un gel que estimula los tejidos celulares y obtiene un efecto *lifting* cosmético visible.
- *Protient Lift Noche*. Es una crema reafirmante que asocia la efectividad de *Protient* y estimula los tejidos celulares con un complejo restructurante exclusivo con el fin de obtener una piel visiblemente más firme.
- *Protient Lift Contorno de Ojos*. Se trata de un gel-crema fresco y suave que se aplica bajo la crema hidratante. Tiene efecto *lifting* en el contorno de ojos y reduce las bolsas oculares. Asimismo, redensifica los tejidos y atenúa las ojeras.

Protient Lift Día
Tubo de 40 ml
CN 347815

Protient Lift Noche
Tubo de 40 ml
CN 259549

Protient Lift Contorno de Ojos
Tubo de 15 ml
CN 175125

Unifiance Touche Pro, innovación en maquillaje de rostro

La Roche-Posay, laboratorio farmacéutico experto en maquillaje dermatológico que responde a las necesidades de las pieles con imperfecciones cutáneas con su amplia gama de productos Unifiance, lanza la última innovación tecnológica en maquillaje de rostro: *Unifiance Touche Pro*, el toque profesional de las imperfecciones localizadas. Este producto está indicado para aquellas mujeres que buscan la corrección instantánea de las imperfecciones cutáneas localizadas o acentuadas.



Unifiance Touche Pro proporciona un resultado de maquillaje natural y un acabado ultrafino sin efecto máscara.

Unifiance Touche Pro
Caja de 9 g

Su poder cubriente, modulable según el tipo de imperfección, permite corregir desde la más ligera a la más grave en un solo gesto.

Suero despigmentante Iklen



El otoño es la época del año en la que más cuidados necesita la piel si queremos que esté limpia y cuidada, porque al desaparecer el bronceado es cuando afloran las manchas oscuras de la cara que se ocultaban tras aquél.

Iklen elimina las manchas gracias a su principio activo rucinol, una exclusiva fórmula que devuelve a la piel todo su esplendor y prepara la cara para afrontar el invierno en las mejores condiciones.

Con el suero despigmentante *Iklen* las manchas oscuras desaparecen eficazmente en 6-8 semanas, sin riesgos de tolerancia o efectos secundarios.

Iklen
Suero cuidado
intensivo de 30 ml

Denivit Express White, nuevo blanqueador dental

Denivit, la marca de dentífricos de Schwarzkopf & Henkel, completa la gama de productos blanqueadores con el lanzamiento de *Denivit Express White*, el blanqueador dental intensivo para tener una sonrisa más blanca en tan sólo una semana.

Denivit Express White elimina las manchas del esmalte de forma muy rápida y eficaz, y proporciona resultados blanqueadores naturales gracias a su fórmula avanzada que contiene ingredientes utilizados por los dentistas. Además, este nuevo dentífrico contiene flúor, que combate la caries, reduce la placa bacteriana y deja un aliento fresco.

Denivit Express White
Envase de 20 ml



Cajas de guardias para la dispensación nocturna

La dispensación nocturna de medicamentos se puede realizar cómodamente y con la máxima seguridad, sin necesidad de que los clientes penetren en el interior de local farmacéutico (RD 2.364/1994 sobre Seguridad Privada).

Tecny-Farma ofrece «cajas de guardia» de acero inoxidable, con amplio cajón de dispensación para medicamentos y productos de gran tamaño. Su facilidad de uso y elegante diseño permite acoplarla en muros de diferente grosor, así como de cualquier tipo de perfilaría metálica.

Las características principales de estas cajas son:

- Visor de seguridad.
- Rejilla de intercomunicación.
- Ranura para la introducción de correo, recetas y dinero.
- Cajón de dispensación con doble sistema de seguridad.

También se puede disponer de cajas de guardia con iluminación propia, personalizarlas con el nombre de la farmacia y colocar carteles informativos sobre las farmacias de guardia correspondientes.



ALGIDOL®

20 sobres

Composición por sobre. Paracetamol (DCI) 650 mg. Codeína (DCI) fosfato 10 mg. Ácido ascórbico (DCI) 500 mg. Excipientes (Sacarosa (3,68 g), sacarina sódica, sílice coloidal, cloruro sódico, aroma de naranja y colorante naranja (E-110)). Actividad. Analgésico, antipirético. Indicaciones. Dolor de intensidad moderada, como sucede en ciática, cefalea, neuralgias y en dolor postquirúrgico o del postparto. Estados febriles. Posología. La dosis deberá ajustarse de acuerdo con la gravedad del dolor y la respuesta del paciente. Paracetamol Adultos. 325-650 mg cada 4-6 horas ó 500-1000 mg 3 ó 4 veces en 24 h. No se excederá de 4 g cada 24 h. Niños. Puede establecerse un esquema de dosificación de 10 mg/kg por toma. De 1 a 2 años: 120 mg. De 2 a 3 años: 160 mg. De 4 a 5 años: 240 mg. De 6 a 8 años: 320 mg. De 9 a 10 años: 400 mg. Mayores de 10 años: 480 mg. Estas dosis pueden repetirse 4-5 veces al día sin exceder de un total de 5 dosis en 24 horas. Codeína Adultos. 15 a 60 mg cada 4-6 h. No superar los 120 mg en un día (24 horas). Niños. (a partir de 1 año) 0,5 mg/kg por toma cada 4-6 horas, pero sin superar las 4 dosis en un período de 24 horas. La administración del preparado está supeditada a la aparición de los síntomas dolorosos o febriles. A medida que estos desaparezcan debe suspenderse esta medicación. Modo de empleo. Disuélvase el contenido del sobre en medio vaso de agua. Contraindicaciones. Enfermedades hepáticas. Hipersensibilidad al paracetamol o codeína. Embarazo. Abuso y dependencia. La administración prolongada y excesiva de codeína al igual que otros analgésicos mayores, puede ocasionar dependencia psíquica, dependencia física y tolerancia con síntomas de abstinencia consecutivos a la suspensión súbita del fármaco. Por esta razón debe ser prescrito y administrado con el mismo grado de precaución que con otros analgésicos mayores, principalmente en pacientes con tendencia al abuso y adicción. Después de tratamientos prolongados debe interrumpirse gradualmente la administración y por indicación facultativa. Advertencias. Advertencias sobre excipientes. Este medicamento contiene 3,68 g de sacarosa por sobre, lo que deberá ser tenido en cuenta en pacientes con intolerancia hereditaria a la fructosa, problemas de absorción de glucosa/galactosa, deficiencia de sacarasa-isomaltasa y pacientes diabéticos. Por contener colorante naranja (E-110) como excipiente, puede causar reacciones de tipo alérgico, incluido asma, especialmente en pacientes alérgicos al ácido acetil salicílico. Advertencia para los deportistas. Se informa a los deportistas que este medicamento contiene un componente que puede establecer un resultado analítico de control de dopaje como positivo. Precauciones. El paciente con insuficiencia hepática y/o renal, anemia, afecciones cardíacas o pulmonares, evitar tratamientos prolongados. En pacientes debilitados, ancianos o con lesiones intracraneales, hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, hipertrofia prostática, asma u otras enfermedades obstructivas pulmonares. Debe tenerse precaución al conducir vehículos, manejar maquinaria peligrosa y en general en aquellas actividades donde la falta de concentración y de destreza suponga un riesgo. No exceder la dosis recomendada. Se aconseja consultar al médico para usarlo en niños menores de tres años o en tratamientos de más de 10 días. No deben tomarse dosis altas durante el embarazo. En pacientes diabéticos existe la posibilidad de resultados erróneos en las pruebas de glucosa en orina, incluyendo las pruebas por tiras reactivas. No deben tomar dosis altas (sin previa consulta del médico) los pacientes con predisposición a cálculos renales. Interacciones. Puede aumentar la toxicidad de cloranfenicol. En caso de tratamientos con anticoagulantes orales se puede administrar, ocasionalmente, como analgésico de elección. El uso simultáneo de anticolinérgicos y codeína puede ocasionar obstrucción intestinal. Puede potenciar el efecto sedante de los depresores del SNC como ansiolíticos, antipsicóticos, antihistamínicos y alcohol. La utilización de antidepresivos tricíclicos o IMAO junto con codeína puede ocasionar un aumento de los efectos de ambos. El ácido ascórbico en dosis altas (más de 2 g al día) puede modificar la acción de ciertos medicamentos. Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando antidepresivos, anticoagulantes, dosis altas de salicilatos, sulfamidas o trimetoprim/sulfametoxazol. Efectos secundarios. Hepatotoxicidad con dosis altas en tratamientos prolongados. Estreñimiento, confusión, aturdimiento, sedación, dificultad en la respiración, náuseas y vómitos. Raramente pueden aparecer erupciones cutáneas y alteraciones hematológicas, como neutropenia o leucopenia. Intoxicación y su tratamiento. La sintomatología por sobredosis incluye mareos, vómitos, pérdida de apetito, ictericia, dolor abdominal, depresión respiratoria, somnolencia extrema. Si se ha ingerido una sobredosis debe acudir rápidamente a un Centro Médico aunque no haya síntomas, ya que éstos muy graves, se manifiestan generalmente a partir del tercer día después de su ingestión. Se considera sobredosis de paracetamol, la ingestión de una sola toma de más de 6 g en adultos y más de 100 mg por kg de peso en niños. Pacientes en tratamiento con barbitúricos o alcohólicos crónicos, pueden ser más susceptibles a la toxicidad de una sobredosis de paracetamol. El tratamiento consiste en aspiración y lavado gástrico, carbón activado vía oral, administración intravenosa de N-acetilcisteína a dosis adecuadas y, si es preciso, hemodiálisis. El período en el que el tratamiento ofrece la mayor garantía de eficacia se encuentra dentro de las 12 horas siguientes a la ingestión de la sobredosis. En presencia de depresión respiratoria, clínicamente importante, se debe administrar naloxona, junto con las medidas necesarias para controlar la respiración. "En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica. Teléfono 915 620 420". Presentación y P.V.P. (IVA). Algídol 12 sobres: 2,21 €. Algídol 20 sobres: 3,35 €. Reembolsado por la Seguridad Social. Nombre y domicilio social del titular de la autorización. ALMIRALL PRODESFARMA, S.A. Ronda General Mitre, 151- 08022. Barcelona. Fecha última revisión: Julio 2004.

Sandoz comercializa las EFG deflazacort y cetirizina

Sandoz (Grupo Novartis) amplía su vademécum para el tratamiento de enfermedades respiratorias con el lanzamiento de *Deflazacort Sandoz EFG* y de *Cetirizina Sandoz EFG*. Ambas especialidades genéricas están indicadas en el tratamiento de enfermedades respiratorias.

Deflazacort está indicado en el tratamiento del asma bronquial refractario a la terapia convencional, así como en otras enfermedades respiratorias como la sarcoidosis con afección pulmonar o la alveolitis alérgica.

Por su parte, la cetirizina está indicada para el tratamiento sintomático de la rinitis alérgica, tanto estacional como perenne, y de la urticaria idiopática crónica. Este tratamiento puede prescribirse en niños a partir de 6 años que presenten alguna de estas dos enfermedades.

Deflazacort Sandoz EFG
 Envase de 20 comprimidos de 6 mg
 CN 786129

Deflazacort Sandoz EFG
 Envase de 10 comprimidos de 30 mg
 CN 790725


Cetirizina Sandoz EFG
 Envases de 20 comprimidos de 10 mg
 CN 786798



Enema Casen®

NOMBRE DEL PRODUCTO: Enema Casen. **FÓRMULA.** Fosfato monosódico monohidratado. %:16.0- Frasco de 250 ml: 40.0g- Frasco de 140 ml: 22.4 g- Frasco 80 ml: 12.8 g. Fosfato bisódico dodecahidratado. %: 8.0-Frasco de 250 ml:20.0 g-Frasco de 140 ml: 11.2 g-Frasco de 80 ml:6.4 g. Nipagin sódico. %: 0.05- Frasco de 140 ml: 70.0 mg – Frasco de 80 ml: 40.0 mg. Agua c.s.p. %: 100.0 Frasco de 250 ml: 250.0 ml- Frasco de 140 ml- Frasco de 80 ml: 80.0 ml. **INDICACIONES:** En todos los casos en que sea necesario vaciar o limpiar el recto. Antes de radioscopia o radiografía. En pre y post cirugía. En el parto y post-parto. Y, en general, cuando con fines terapéuticos sea conveniente una completa limpieza del intestino grueso. **DOSIFICACIÓN:** Como norma orientativa: En adultos: 1-2 enemas de 140-250ml, según la naturaleza de la exploración o del cuadro clínico presente. En niños: 1 enema de 80 ml. Será el médico en cualquier caso, quien pueda modificar estas pautas. **CONTRAINDICACIONES:** No debe administrarse a paciente que tengan náuseas, vómitos, dolores abdominales y trastornos electrolíticos. En ningún caso, a enfermos con sospecha de oclusión intestinal, megacolon, estenosis anorrectal, enfermedad de Hirschprung o insuficiencia renal grave o moderada. **PRECAUCIONES:** Se administrará con precaución a pacientes efectos de insuficiencia renal leve y sólo bajo prescripción facultativa a niños menores de 2 años. **INCOMPATIBILIDADES E INTERACCIONES:** No se han descrito. **EFFECTOS SECUNDARIOS:** Aunque muy poco frecuentes, pueden darse casos de hipocalcemia e hiperfosforemia graves. Si se observa en el paciente irritabilidad, hipotensión, cianosis, tetania, taquicardia, convulsiones, obnubilación e, incluso, estado comatoso, debe consultarse inmediatamente al médico. **ADVERTENCIAS:** En condiciones normales, la mayor absorción de fósforo tiene lugar a nivel del intestino delgado, órgano que nunca alcanza un preparado administrado por vía rectal en forma de enema. La hiperfosforemia provocará una hipocalcemia para mantener el cociente Ca/P, pudiendo conducir a un grave estado de hipocalcemia, deshidratación hipernatémica y compromiso hemodinámico, con la sintomatología descrita en el apartado Efectos Secundarios, que puede confundirse con un shock endotóxico. A nivel clónico, la absorción es mínima, lo que justifica la utilización de sales de fosfato para la preparación de enemas. Pero si existen alteraciones en el colon que aumenten la permeabilidad de la mucosa a la permanencia prolongada del preparado en la luz intestinal, puede provocarse una hipocalcemia e hiperfosferemia graves cuando se administra este medicamento si existe oclusión intestinal, megacolon, estenosis anorrectal, ano imperforado, colostomía de descarga, enfermedad de Hirschprung, en cuadros clínicos con trastornos hidroelectrolíticos o en pielonefritis e insuficiencia renal. **INTOXICACIONES Y SU TRATAMIENTO:** En los raros casos en que mayor absorción de fosfatos produzca un cuadro clínico dependiente de la alteración del equilibrio calcio-fósforo, secundaria a la administración de un enema de fosfatos, el tratamiento debe consistir en la corrección de las alteraciones electrolíticas por aporte de sales cálcicas y magnésicas al mismo tiempo se favorece la eliminación del fósforo exógeno mediante diálisis, si fuera necesario, todo ello bajo monitorización en una Unidad de Cuidados Intensivos. En caso de sobredosis o ingestión accidental, consultar al Servicio de Información Toxicológica en el teléfono 91 562 04 20. **ADMINISTRACIÓN:** Vía rectal únicamente. **PRESENTACIONES:** Envases de 250, 140 y 80 ml de plástico flexible, herméticamente cerrados con cánula rectal prelubricada. **NORMAS PARA LA CORRECTA ADMINISTRACIÓN DEL PREPARADO:** Puede aplicarse a temperatura ambiente, sin necesidad de calentar. Quitar la funda protectora de la cánula prelubricada. El paciente debe estar reclinado sobre el lado izquierdo y con las piernas dobladas sobre el pecho. En la posición indicada, introdúzcase la cánula en el recto y oprímase el envase de manera suave y continuada, hasta que penetre la cantidad de líquido requerida. Conviene que el paciente mantenga dicha posición hasta que sienta fuertes deseos de defecar. Generalmente, de 3 a 5 minutos son suficientes para obtener el efecto deseado. **RÉGIMEN DE PRESCRIPCIÓN:** Sin receta médica. P.V.P Frasco de 250 ml: 2,29€ - Frasco de 140 ml: 2,03€- Frasco de 80 ml: 1,92€. P.V.P IVA 4%. Frasco de 250 ml: 2,38€ - Frasco de 140 ml: 2,11€ Frasco de 80 ml: 1,99€ **NOMBRE O RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO PERMANENTE O SEDE SOCIAL DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Laboratorios Casen-Fleet, S.A. Autovía de Logroño, km. 13,300. 50180-Utebo (Zaragoza).

Bioralsuero, primera sal de rehidratación oral con probióticos



Laboratorios Casen Fleet anuncia el lanzamiento de *Bioralsuero*, la primera solución de rehidratación oral (SRO) lista para su uso disponible en España, que incorpora *Lactobacillus reuteri* en el interior de la pajita. *Bioralsuero* posee todas las propiedades de las SRO, además de las propiedades de los probióticos, para acortar la duración de los procesos diarreicos y facilitar la recuperación de los pacientes con deshidratación (especialmente los pacientes pediátricos) gracias a su sabor a fresa y a su presentación en *tetra-brick* de 200 ml.

Bioralsuero es una bebida destinada al aporte de líquidos y sales recomendado para la prevención y el manejo de las deshidrataciones causadas por procesos diarreicos o vómitos.

Bioralsuero
Envase de 200 ml

NOTA IMPORTANTE

La información publicada en esta sección no ha sido contrastada por la redacción de OFFARM, que se limita a adaptar las notas de prensa recibidas a los criterios de estilo de la revista, por lo que los únicos responsables del contenido son las propias empresas. Para la inserción de las novedades farmacéuticas es imprescindible que las empresas interesadas envíen una nota de prensa que incluya: características generales del producto, tipo de presentación y código nacional.

1. NOMBRE DEL MEDICAMENTO: Amlodipino ratiopharm 5 mg comprimidos EFG. Amlodipino ratiopharm 10 mg comprimidos EFG. **2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA:** Cada comprimido contiene como principio activo: Amlodipino ratiopharm 5 mg comprimidos: Amlodipino (besilato) 5 mg. Amlodipino ratiopharm 10 mg comprimidos: Amlodipino (besilato) 10 mg. **3. FORMA FARMACÉUTICA:** Comprimidos. **4. DATOS CLÍNICOS:** **4.1. Indicaciones terapéuticas:** **Hipertensión arterial:** Amlodipino está indicado como tratamiento de primera línea de la hipertensión y puede emplearse como medicamento único para controlar la presión arterial en la mayoría de los pacientes. Los enfermos no suficientemente controlados con un solo antihipertensivo pueden beneficiarse de la adición de amlodipino, el cual se ha empleado en asociación con diuréticos tiazídicos, alfbloqueantes, bloqueadores de los receptores beta-adrenérgicos o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. **Isquemia miocárdica:** Amlodipino está indicado como tratamiento de primera línea de la isquemia miocárdica bien sea debida a obstrucción fija (angina estable) y/o vasoespasm/vasoconstricción (angina variante o de Prinzmetal) de la vasculatura coronaria. Amlodipino puede utilizarse cuando el cuadro clínico sugiera un posible componente vasoespástico/vasoconstrictor, aunque éste aún no haya sido confirmado. Amlodipino puede emplearse solo, como monoterapia, o asociado con otros antianginosos, en pacientes con angina refractaria a los nitratos y/o a las dosis adecuadas de betabloqueantes. **4.2. Posología y forma de administración:** Tanto para la hipertensión como para la angina, la dosis inicial habitual es la de 5 mg de amlodipino una vez al día, que puede aumentarse hasta un máximo de 10 mg, según la respuesta individual del paciente. No es necesario el ajuste de la dosis de amlodipino cuando se administra simultáneamente con diuréticos tiazídicos, betabloqueantes o inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina. **Ancianos:** No es necesario un ajuste de dosis. **Niños:** La seguridad y eficacia de amlodipino no se han establecido en niños, por lo que no se recomienda su uso en este grupo de población. **Pacientes con insuficiencia hepática:** Se debe ajustar la dosis, por lo que se recomienda administrar amlodipino con precaución en estos pacientes (ver sección 4.4 "Advertencias y precauciones especiales de empleo"). **Pacientes con insuficiencia renal:** Amlodipino puede utilizarse a dosis normales. Las variaciones de las concentraciones plasmáticas de amlodipino no se correlacionan con el grado de afectación renal. Amlodipino no es dializable. **4.3. Contraindicaciones:** Amlodipino está contraindicado en los pacientes con hipersensibilidad conocida a las dihidropiridinas, a amlodipino o a cualquiera de los excipientes. **4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo:** **Insuficiencia hepática:** Como con todos los antagonistas del calcio, en los pacientes con alteración de la función hepática, la semivida de amlodipino está prolongada, y no se han establecido recomendaciones para su dosificación. En consecuencia, en estos pacientes el fármaco deberá administrarse con precaución. **4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:** Amlodipino se ha administrado con seguridad junto con: diuréticos tiazídicos, alfbloqueantes, betabloqueantes, inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, nitratos de acción prolongada, nitroglicerina sublingual, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos e hipoglucemiantes orales. Estudios en voluntarios sanos han puesto de manifiesto que la administración simultánea de amlodipino y digoxina no modificó las concentraciones séricas ni el aclaramiento renal de digoxina y que la administración simultánea de cimetidina no modificó la farmacocinética de amlodipino. Datos *in vitro* procedentes de estudios con plasma humano, indican que amlodipino carece de efectos sobre la unión a proteínas de los fármacos estudiados (digoxina, fenitoína, warfarina o indometacina). En voluntarios sanos varones, la administración concomitante de amlodipino no altera significativamente el efecto de warfarina sobre el tiempo de respuesta a la protrombina. Los antagonistas del calcio pueden inhibir el metabolismo, dependiente del citocromo P450, de ciclosporina, teofilina y ergotamina. Sin embargo, datos procedentes de estudios de farmacocinética con ciclosporina demuestran que amlodipino no modifica de forma significativa la farmacocinética de ciclosporina. Dado que no existen estudios *in vitro* e *in vivo* sobre la posible interacción de teofilina y ergotamina con amlodipino, se recomienda monitorizar los niveles plasmáticos de estos productos cuando se administre amlodipino concomitantemente con alguno de ellos. **4.6. Embarazo y lactancia:** La seguridad de amlodipino durante el embarazo o lactancia no se ha establecido. En los estudios de reproducción animal, amlodipino produce retraso del parto y prolongación del trabajo en la rata con dosis cincuenta veces superiores a las máximas recomendadas para el hombre. Según esto, su administración durante el embarazo sólo se aconseja cuando no haya otra alternativa más segura y cuando la propia patología plantea riesgos mayores para la madre y para el feto. **4.7. Efectos sobre la capacidad para conducir y utilizar maquinaria:** Basado en la experiencia clínica, no es probable que amlodipino produzca algún efecto sobre la capacidad del paciente para conducir vehículos o manejar maquinaria peligrosa. **4.8. Reacciones adversas:** En los ensayos clínicos controlados con placebo, en los que participaron enfermos con hipertensión o angina, los efectos adversos más comúnmente observados fueron: cefaleas, edemas, fatiga, somnolencia, náuseas, dolor abdominal, enrojecimiento, palpitaciones y mareo. En estos ensayos clínicos no se ha observado ningún patrón de alteración clínicamente importante de las pruebas de laboratorio relacionado con amlodipino. Después de su comercialización, se han observado, aunque con menor frecuencia, efectos adversos tales como: alopecia, alteración de los hábitos intestinales, artralgia, astenia, dolor de espalda, dispepsia, disnea, hiperplasia gingival, ginecomastia, hiperglucemia, impotencia, aumento de la frecuencia urinaria, leucopenia, malestar general, cambios de humor, sequedad de boca, calambres musculares, mialgia, neuropatía periférica, pancreatitis, aumento de la sudoración, síncope, trombocitopenia, vasculitis y alteraciones visuales. En muchos casos, la asociación causal es incierta. Raramente, se han observado reacciones alérgicas, incluyendo prurito, rash, angioedema y eritema multiforme. Se han comunicado muy raramente también hepatitis, ictericia y elevación de las enzimas hepáticas (la mayoría consistentes con colestasis). Se han comunicado algunos casos, asociados con el uso de amlodipino, que por su gravedad requirieron hospitalización. En muchos casos, la asociación causal es incierta. Al igual que con otros antagonistas del calcio, raramente se han comunicado los siguientes efectos adversos, que no pueden distinguirse del curso natural de la enfermedad subyacente: infarto de miocardio, arritmia (incluyendo taquicardia ventricular y fibrilación auricular) y dolor torácico. **4.9. Sobredosificación:** La experiencia de sobredosificación intencionada en humanos es limitada. En algunos casos el lavado de estómago puede ser útil. Los datos disponibles sugieren que una sobredosificación grave puede provocar una vasodilatación periférica excesiva con la consiguiente hipotensión sistémica marcada y, probablemente, prolongada. La hipotensión clínicamente importante, debida a la sobredosis de amlodipino, exige el apoyo cardiovascular activo, incluida la monitorización frecuente de las funciones cardíaca y respiratoria, la elevación de las extremidades y el control del volumen circulante y de la excreción de orina. La administración de medicamentos vasoconstrictores puede ser útil para restablecer el tono vascular y la presión arterial, siempre que su administración no esté contraindicada. La administración intravenosa de gluconato cálcico puede ser de utilidad para revertir los efectos del bloqueo de los canales del calcio. Como amlodipino está altamente unido a las proteínas, no es probable que la diálisis aporte beneficio alguno. **5. DATOS FARMACÉUTICOS:** **5.1. Incompatibilidades:** No procede. **5.2. Precauciones especiales de conservación:** No conservar a temperatura superior a 30°C. **5.3. Naturaleza y contenido del recipiente:** Amlodipino ratiopharm 5 mg comprimidos EFG: envase alveolar de PVC blanco opaco/aluminio tipo blister de 30 y 500 comprimidos. Amlodipino ratiopharm 10 mg comprimidos EFG: envase alveolar de PVC blanco opaco/aluminio tipo blister de 30 y 500 comprimidos. **5.4. Instrucciones de uso/manipulación:** No se requieren instrucciones especiales. **6. TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** ratiopharm España, S. A. Avda. de Burgos, 16-D, 5ª planta 28036 - Madrid. **7. CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN:** Con receta médica. Apotación reducida. Tratamiento de larga duración. **8. PRECIOS*:** Amlodipino ratiopharm 5 mg comprimidos EFG: 30 comprimidos PVPIVA: 13,24 €. Amlodipino ratiopharm 10 mg comprimidos EFG: 30 comprimidos PVPIVA: 19,87 €. * Precios válidos a Enero 2004.