

COMENTARIOS

En esta Sección deseamos una simple opinión de personas calificadas en el campo de la Patología Vascular.

HEMANGIOMATOSIS BRAQUIAL OSTEOLITICA

F. MARTORELL

Director del Departamento de Angiología del Instituto Policlínico de Barcelona (España)

En el volumen XXVII, n.º 4, página 163, correspondiente a julio-agosto de 1975, publicábamos un caso de Hemangiomas braquiales osteolíticos observado en un niño de tres años de edad, que presentaba todas las características propias de esta enfermedad excepto una: la comprobación radiológica de angiomas. Este era el hecho más sobresaliente del caso y el motivo de su publicación acompañada de la adecuada documentación gráfica demostrativa.

Dos años más tarde hemos visto de nuevo al pequeño enfermo, el cual ha seguido un tratamiento conservador durante este tiempo, manteniéndose estacionaria su evolución. Pero se ha producido un hecho nuevo, que ya entonces en nuestra primera relación apuntábamos, y es la posibilidad de que con el tiempo aparecieran aquellos angiomas en aquel momento ausentes. En efecto, una nueva radiografía practicada en el año actual, 1977, demuestra ya la presencia de dichos angiomas, con lo que se completa la tríada sintomática fundamental de la enfermedad.