

La imagen del mes

Linfangioma quístico hepático: una causa excepcional de dolor abdominal en el adulto

Cystic hepatic lymphangioma: a rare cause of abdominal pain in the adult

Emilio Peña Ros*, Mari Fe Candel Aremas, Patricia Pastor Pérez
y Antonio Albarracín Marín-Blázquez

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital General Universitario Reina Sofía, Murcia, España



Figura 1



Figura 2

Mujer de 20 años. Acude a Urgencias por dolor y distensión abdominal. A la exploración presenta sensación de ocupación en hipocondrio y vacío derecho, con defensa voluntaria, sin irritación peritoneal. En la radiografía de abdomen se observa marco cólico desplazado por efecto masa en hemiabdomen derecho (fig. 1). Se realiza TC abdominal (fig. 2) que informa de quiste hepático de 13,3 cm x 9,3 cm x 9,7 cm que depende del lóbulo hepático derecho (segmento V) desplazando caudalmente al riñón derecho, con escasa cantidad de líquido libre en cavidad. Se interviene quirúrgicamente encontrando gran tumoración quística hepática (15 x 9 cm), realizando resección del mismo. Informe anatomopatológico: linfangioma quístico hepático.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: emilio.doctor@gmail.com (E. Peña Ros).

0009-739X/\$ - see front matter © 2011 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

doi:10.1016/j.ciresp.2011.08.010