

La imagen del mes

Hibernoma pélvico gigante ☆

Giant pelvic hibernoma

Macarena Fernández Alborno ^{*}, Joaquín Irarrázaval Espinosa, Andrés Larach Kattan y Leonardo Espíndola Silva

Servicio de Cirugía, Hospital Militar de Santiago, Chile



Figura 1



Figura 2

Varón de 48 años consulta por dolor neuropático de extremidad inferior izquierda y masa en glúteo ipsilateral. La RNM muestra un lipoma pélvico de 20 cm de diámetro, con trayecto en el orificio ciático mayor y desplazamiento de estructuras adyacentes (figs. 1 y 2). Se realizó resección local completa. La histopatología reveló un hibernoma de 980 g.

El hibernoma es una variante infrecuente del lipoma, asociado a una alteración citogenética específica. Su ubicación es diversa, generando aumento de volumen y síntomas compresivos. La resección completa está indicada en casos sintomáticos o diagnóstico dudoso. No tiene potencial de malignidad ni de recidiva.

☆ Informe preliminar del trabajo presentado en el LXXII Congreso Chileno e Internacional de Cirugía, XLI Jornadas Chilenas de Coloproctología, 25 de noviembre de 2009, La Serena, Chile.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: macaferal@gmail.com (M. Fernández Alborno).

0009-739X/\$ – see front matter © 2013 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2013.06.006>