



La imagen del mes

Utilidad de la arteriografía y marcaje con azul de metileno para el diagnóstico de tumor estromal en yeyuno



Use of arteriography and methylene blue tattoo for the diagnosis of a jejunal stromal tumour

María D. Balsalobre Salmeron*, Francisco Javier Espinosa, María Aránzazu García López y Nuria María Torregrosa Pérez

Servicio de Cirugía General y Aparato digestivo, Complejo Universitario Santa Lucía, Cartagena, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 26 años. Remitido por cuadro de melenas recurrentes. Hemodinámicamente estable, con hemoglobina de 6, precisó transfusión de 4 concentrados de hematíes. Se realizaron gastroscopia y colonoscopia, que fueron normales.

Se realizó arteriografía, observando a nivel de yeyuno área hipercantacte de 3 cm de yeyuno, correspondiente a vasos arteriales hipertróficos (fig. 1). Sin sangrado activo. Compatible con malformación vascular vs proceso rumoral.

Se procede a marcaje con azul de metileo, para guiar la resección quirúrgica. En la cirugía se halla tumoración en yeyuno proximal teñida y divertículo de Meckel. Se procede a la resección de tumoración y divertículo (fig. 2). El informe anatomo-patológico es: tumor estromal gastrointestinal (pT2) de bajo potencial.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: mariadolores.balsalobre2@um.es (M.D. Balsalobre Salmeron).
0009-739X/\$ - see front matter © 2013 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2013.12.004>