



La imagen del mes

Obstrucción intestinal secundaria a hernia diafragmática incarcerada tras operación de Ivor-Lewis



Intestinal obstruction caused by an incarcerated diaphragmatic hernia after an Ivor-Lewis procedure

Silvia Gálvez Pastor*, José Luis Vázquez Rojas, María Aránzazu García López
y María D. Balsalobre Salmerón

Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital General Universitario Santa Lucía, Cartagena, España



Figura 1



Figura 2

Varón de 68 años, con antecedente de adenocarcinoma esofágico (ypT3N1M0) tratado con quimioterapia neoadyuvante y esofagectomía según técnica de Ivor Lewis mínimamente invasiva (tiempo abdominal) hace un año.

Acudió a Urgencias por dolor abdominal, vómitos y estreñimiento de 3 días de evolución. A la exploración presentaba disnea, el abdomen era doloroso, sobre todo en hemiabdomen derecho, con defensa y signos de irritación peritoneal.

En la radiografía de tórax se observó una burbuja aérea supradiafragmática (fig. 1), por lo que se realizó tomografía computarizada que mostró ascenso del colon transverso a través del hiato diafragmático, con distensión de colon derecho y colapso del colon izquierdo (fig. 2).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: silviagalpa@hotmail.com (S. Gálvez Pastor).
0009-739X/\$ - see front matter © 2013 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L. Todos los derechos reservados.
<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2013.12.020>