

La imagen del mes

## Invaginación yeyuno-gástrica tras gastrectomía tipo Billroth II<sup>☆</sup>



### Jejuno-gastric invagination after Billroth II gastrectomy

Arturo Cruz Cidoncha<sup>a,\*</sup>, Laura Garcia del Salto<sup>b</sup>, Enrique González González<sup>a</sup>  
y Miguel Ángel García-Ureña<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, España

<sup>b</sup>Servicio de Radiología, Hospital Universitario del Henares, Coslada, Madrid, España



Figura 1



Figura 2

Paciente de 69 años con el antecedente de gastrectomía parcial por úlcera gastroduodenal que acudió a urgencias por dolor abdominal. A la exploración presentaba un abdomen distendido y doloroso difusamente. Se realizó tomografía computarizada donde se identificó la invaginación de un tramo largo de meso y yeyuno en el remanente gástrico (figs. 1 y 2) con marcada dilatación gástrica que alcanza la pelvis (fig. 1). Es intervenido encontrando una invaginación yeyuno-gástrica a través de una amplia anastomosis gastro-yeyunal con gran dilatación del remanente gástrico. Se realizó desinvaginación y pexia del asa eferente en la pared antero-lateral derecha. El curso postoperatorio evolucionó sin complicaciones.

<sup>☆</sup> El caso clínico presentado en este trabajo ha sido aceptado para su comunicación en formato poster en el XXX Congreso Nacional de Cirugía.

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [acidoncha@hotmail.com](mailto:acidoncha@hotmail.com) (A. Cruz Cidoncha).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2014.11.002>

0009-739X/© 2014 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.