



La imagen del mes

Absceso subcutáneo. Presentación atípica de colecistitis aguda



Subcutaneous abscess. Atypical presentation of acute cholecystitis

Lorena España Fuente^{a,*}, Rubén Darío Arias Pacheco^b, Jesús Bujarrabal Martínez^a y Pablo Ignacio Fernández Muñiz^b

^a Servicio de Anestesiología y Reanimación, Hospital San Agustín, Avilés, Asturias, España

^b Servicio de Cirugía General, Hospital San Agustín, Avilés, Asturias, España



Figura 1



Figura 2



Figura 3

Mujer de 66 años con absceso subcutáneo en hipocondrio derecho (fig. 1). El TAC mostraba una colección perivesicular que llegaba hasta fosa hepatorenal (fig. 2) comunicando a través de la pared abdominal con otra en tejido celular subcutáneo (fig. 3).

La fístula colecisto-cutánea espontánea con formación de absceso subcutáneo es una complicación grave e inhabitual de la colecistitis aguda que se confirma mediante TAC y/o fistulografía, descartando así un diagnóstico erróneo de un proceso local infeccioso cutáneo, un granuloma piógeno o una metástasis.

Diagnóstico: Colecistitis aguda perforada fistulizada a pared abdominal formando un absceso subcutáneo.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: lorenespana@yahoo.es (L. España Fuente).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2015.10.006>

0009-739X/© 2015 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.