



La imagen del mes

Úlcera gástrica penetrante en el hígado

Gastric ulcer penetrating the liver



Lucía Lesquereux-Martínez^{a,*}, Ana María Álvarez^b, Purificación Parada-González^a
y Manuel Bustamante-Montalvo^a

^aServicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España

^bServicio de Aparato Digestivo, Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela, Santiago de Compostela, A Coruña, España



Figura 1

Paciente de 66 años, sin antecedentes relevantes, que consultó por melenas. En la analítica destacaba hemoglobina de 3,8 g/dl. Se practicó una endoscopia que identificó gran orificio en la cara anterior del antro, hacia la incisura, que conducía a una cavidad profunda y excavada, con amplio fondo de aspecto hemático. Las biopsias descartaron malignidad.

La tomografía computarizada abdominal reveló gran ulceración a nivel de la curvatura menor gástrica, que contactaba con el lóbulo hepático izquierdo, con pérdida de plano respecto a este y cambios inflamatorios de la grasa adyacente (fig. 1). Se instauró tratamiento médico con evolución favorable.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: lucialesquereux@hotmail.com (L. Lesquereux-Martínez).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.02.003>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.