



La imagen del mes

Hematoma subcapsular esplénico secundario a metástasis de carcinoma epidermoide anal



Subcapsular splenic hematoma due to metastatic squamous cell anal carcinoma

Ángela de la Hoz Rodríguez*, Ismael Mora-Guzmán, José Luis Muñoz de Nova y Adolfo Pedro Alonso Casado

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario de La Princesa, Madrid, España



Figura 1

Varón de 66 años, en seguimiento por carcinoma epidermoide de laringe T₄N₀M₀. Presenta tumoración ulcerada a nivel de margen anal izquierdo de 10 × 5 cm de 2 meses de evolución. La resonancia magnética identifica una tumoración perianal con posible infiltración de músculo puborrectal e implante metastásico a nivel de coxis (fig. 1A). Mediante tomografía computarizada se aprecian múltiples adenopatías inguino femorales y mesentéricas, con metástasis a nivel del riñón izquierdo y en el bazo. Esta última alcanza los 6 cm y condiciona un hematoma subcapsular contenido (fig. 1B). La biopsia anal muestra carcinoma epidermoide de canal anal.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: angelahoz90@gmail.com (Á. de la Hoz Rodríguez).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.02.004>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.