



La imagen del mes

Hemoperitoneo masivo por rotura de vena umbilical en paciente cirrótico



Massive hemoperitoneum due to a ruptured umbilical vein in a cirrhotic patient

Carmen García Bernardo^{a,*}, Elisa Contreras Saiz^a, Raquel Rodríguez Uría^a
y Sara Gálvez García^b

^a Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España

^b Servicio de Radiodiagnóstico, Hospital Universitario Central de Asturias, Oviedo, Asturias, España



Figura 1



Figura 2

Mujer de 46 años diagnosticada hace 6 meses de cirrosis por alcohol. Acude a urgencias por dolor abdominal en mesogastrio y flancos. Analítica con anemia (hemoglobina: 7,8). El servicio de digestivo descarta sangrado del tracto digestivo. En urgencias presenta hipotensión y parada cardiorrespiratoria. Se realiza angio-TC observando hígado cirrótico, hemoperitoneo masivo con extravasación de contraste en la vena umbilical repermeabilizada (figs. 1 y 2). La laparotomía muestra hemoperitoneo, cirrosis con repermeabilización de la vena umbilical, sin otros signos de hipertensión. Se realiza ligadura de la vena umbilical, y evacuación del hemoperitoneo. Desarrolla fallo multiorgánico irreversible, siendo exitus al séptimo día postintervención.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: cmgbernardo2@hotmail.com (C. García Bernardo).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.04.011>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.