



La imagen del mes

Eventración paraestomal encarcerada como manifestación clínica de un hidrops vesicular



Complicated parastomal hernia as a clinical presentation of a gallbladder hydrops

Miquel Gomez-Artacho^{a,*}, Gildas Boisset^b, Christophe Taoum^b y Francis Navarro^b

^a Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España

^b Service de Chirurgie Digestive et Transplantation, Centre Hospitalier Regional Universitaire de Montpellier, Languedoc-Roussillon, Francia



Figura 1

Mujer de 50 años con antecedentes de quimio-radioterapia, histerectomía y resección anterior de recto, por carcinoma de cuello uterino localmente avanzado. Portadora de colostomía lateral en hipocondrio derecho y nefrostomía derecha. Acude a urgencias por dolor abdominal y vómitos, junto con tumefacción paraestomal. En la analítica destaca una elevación de reactantes de fase aguda. Se realiza una tomografía computarizada (fig. 1) que muestra una eventración paraestomal con la vesícula biliar distendida en su interior. Se decide colecistectomía mediante laparotomía subcostal derecha, hallándose hidrops vesicular con signos incipientes de colecistitis aguda por un cálculo enclavado en el Hartmann. Se realiza, también, reparación de la eventración mediante cierre primario del defecto, por la vertiente interna, descartándose reparación con prótesis, dado el carácter provisional de dicha colostomía.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: miquelgomart@hotmail.com (M. Gomez-Artacho).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2016.05.019>

0009-739X/© 2016 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.