



La imagen del mes

Fístula interesfinteriana sin orificio externo y con reentrada en el recto



Intersphincteric fistula without external opening and to re-enter the rectum

Jesús Catalá*, Zutoia Balciscueta, María Carmen Martín y Natalia Uribe

Unidad de Cirugía General y Digestiva, Hospital Arnau de Vilanova, Valencia, España




Figura 1

Mujer de 43 años, estudiada por supuración anal intermitente y diagnosticada por ecografía y resonancia magnética de fístula interesfinteriana alta sin orificio fistuloso externo (clasificación de Parks). Se intervino en posición de navaja, apreciando orificio fistuloso interno anterior a nivel de la línea pectínea y trayecto ascendente interesfinteriano con reentrada en el recto a través de un orificio secundario, tal como describió Parks en raros casos. En la [figura 1](#) observamos un esquema de la anatomía de la fístula junto con imágenes de la canalización del trayecto fistuloso (A) y la marsupialización (B), tras la puesta a plano y legrado del trayecto. La evolución fue satisfactoria, con curación del proceso.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jesuscatala07@gmail.com (J. Catalá).

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ciresp.2017.07.010>

0009-739X/© 2017 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.