



La imagen del mes

Herniación transhiatal del colon postesofagectomía

Post-esophagectomy hiatal hernia of the colon



Joseba Castro Vázquez*, Saioa Leturio Fernández, Carlos Loureiro González e Ismael Díez del Val

Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario de Basurto, Bilbao, España



Figura 1

Varón de 51 años intervenido mediante esofagectomía de Ivor-Lewis con anastomosis manual robótica y cierre hiatal en torno a la plastia gástrica. La evolución postoperatoria no mostró complicaciones y fue dado de alta tras 11 días. Acude a urgencias a los 3 días por dolor abdominal súbito y vómitos. En la radiografía de tórax y abdomen y TC se objetiva una herniación transhiatal de colon con gran dilatación retrógrada (fig. 1). Se decide realizar intervención quirúrgica urgente por laparoscopia. Tras reducir el contenido herniario, se cierra el orificio hiatal y se coloca tubo de tórax izquierdo. El paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta a los 4 días de ingreso.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: Joseba_castro3@hotmail.com (J. Castro Vázquez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2019.01.017>

0009-739X/Publicado por Elsevier España, S.L.U. en nombre de AEC.