



## Video del mes

## Periquistectomía laparoscópica para quiste hidatídico del segmento VIII con compromiso del diafragma

### Laparoscopic pericystectomy for segment VIII hydatid cyst of the liver with diaphragmatic compromise

César Muñoz<sup>a,b,\*</sup> y Cristian Albornoz<sup>a</sup>

<sup>a</sup> Cirugía Hepatobiliopancreática, Hospital Regional de Talca, Maule, Talca, Chile

<sup>b</sup> Departamento de Cirugía, Universidad Católica del Maule, Maule, Talca, Chile

La cirugía laparoscópica en la hidatidosis hepática ha sido poco recomendada para los segmentos superiores del hígado. (fig. 1)



Figura 1

Se presenta el caso de un paciente de 28 años que consultó por ictericia. Se realizó ecografía, tomografía y RNM de abdomen con contraste que evidenciaron barro biliar y un quiste hidatídico del segmento VIII en contacto con el diafragma no complicado. Se realizó colecistectomía con colangiografía transcística y una periquistectomía total con resección del diafragma por laparoscopia (Anexo, Video).

El postoperatorio fue sin complicaciones y fue dado de alta al tercer día del postoperatorio. El paciente completó 12 semanas de albendazol postoperatorio.

#### Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2019.08.005](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2019.08.005).

\* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: [cesarmunozcastro@gmail.com](mailto:cesarmunozcastro@gmail.com) (C. Muñoz).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2019.08.005>

0009-739X/© 2019 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.