



La imagen del mes

Pioderma gangrenoso periostomal en paciente con enfermedad inflamatoria intestinal

Peristomal Pyoderma Gangrenosum in a Patient With Inflammatory Bowel Disease

Amaia Garcia Dominguez*, Yolanda Saralegui Ansorena, Marta Artola Etxeberria y Jose María Enríquez-Navascués

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Donostia, San Sebastián-Donostia, Guipúzcoa, España



Figura 1



Figura 2

Mujer de 77 años con colitis granulomatosa portadora de colostomía ingresada por brote agudo. Presenta úlceras irregulares, profundas y dolorosas en circunferencia periostomal que condicionan su desinserción. En AP de *punch* cutáneo se describe infiltración neutrófila hasta hipodermis, abscesificación focal, microgranulomas y necrosis compatible con pioderma gangrenoso. Se inicia tratamiento con corticoides IV, metronidazol tópico, curas locales con Aquacel® y apósitos hidrocoloides con empeoramiento progresivo de las úlceras (fig. 1), decidiéndose escalar a infiltración con corticoide y tacrolimus pomada al 0,1%. Ante la persistencia del cuadro se inicia tratamiento con infliximab, objetivando mejoría hasta lograr una piel íntegra, sin problemas con los dispositivos (fig. 2).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: amaia93@gmail.com (A. Garcia Dominguez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.07.008>

0009-739X/© 2020 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.