



Video del mes

Duodenopancreatectomía cefálica laparoscópica. Fase resectiva paso a paso en variación de tronco celiaco-mesentérico



Laparoscopic pancreatoduodenectomy. Resective phase step by step in celiac-mesenteric trunk variant

Èric Herrero-Fonollosa^a, Judith Camps-Lasa^a, Alba Zárata-Pinedo^b, Jaume Tur-Martínez^{a,*} y Esteban Cugat-Andorra^{a,b}

^a Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Unidad Cirugía Hepatobiliopancreática, Hospital Universitari Mútua Terrassa, Terrassa, Barcelona, España

^b Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Unidad Cirugía Hepatobiliopancreática, Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona, Barcelona, España



La duodenopancreatectomía cefálica es una de las técnicas quirúrgicas de mayor complejidad y con mayor morbimortalidad en cirugía pancreática. El abordaje laparoscópico sigue sin realizarse en la mayoría de los centros, ya que es necesaria una amplia experiencia en cirugía pancreática y en cirugía laparoscópica avanzada. Asimismo, suele requerir mayor tiempo quirúrgico y existe aún poca evidencia en cuanto a sus beneficios sobre la morbimortalidad.

En el siguiente video se presentan los principales pasos para realizar la fase resectiva de la duodenopancreatectomía cefálica laparoscópica, para el tratamiento de un paciente con neoplasia ampular.

Agradecimientos

Melissa Arias-Avilés, por su contribución en la traducción de la locución al inglés.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2020.09.017](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.09.017).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: jaume.tur.martinez@gmail.com (J. Tur-Martínez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.09.017>

0009-739X/© 2020 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.