



La imagen del mes

Esófago sigmoideo en acalasia evolucionada

Sigmoid megaesophagus as clinical presentation of achalasia



Roser Termes, Dulce Momblán*, Víctor E Gonzabay y Antonio M Lacy

Servicio de Cirugía Gastrointestinal, Hospital Clínic de Barcelona, Barcelona, España



Figura 1

Mujer de 68 años, natural del Perú, con antecedente de disfagia de años de evolución que consulta en urgencias por dolor centrotorácico opresivo posprandial asociado a disnea, disfagia y vómitos. Refiere episodios similares durante los meses previos.

La radiografía de tórax muestra un mediastino aumentado de tamaño, y la TC una severa dilatación esofágica (fig. 1).

La fibrogastroscoopia objetiva un esófago dilatado con abundante contenido alimentario, y descarta causas obstructivas. La serología es negativa para enfermedad de Chagas.

Se realiza una manometría esofágica que es compatible con una acalasia estadio IV.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: DMOMBLAN@clinic.cat (D. Momblán).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2020.12.005>

0009-739X/© 2020 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.