



CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



Video de mes

Absceso postanal profundo. Estrategia diagnóstico-terapéutica de urgencia



Deep postanal abscess. Emergency diagnostic-therapeutic strategy

Natalia Pujol-Cano^{a,*}, Álvaro García-Granero^{a,b}, Laura. Fernández-Vega^a
y Francesc Xavier González-Argenté^{a,b}

^a Servicio de Cirugía General, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca, Islas Baleares, España

^b Facultad de Medicina, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca, Islas Baleares, España

El espacio postanal profundo (EPP) se localiza posterior al canal anal. En el plano sagital presenta como límite anterior el complejo del esfínter externo, como límite posterior-inferior el cóccix y el ligamento anococcígeo y como límite superior el músculo elevador del ano. El absceso localizado en este espacio es conocido como absceso postanal profundo (APP) y puede originar los abscesos en herradura posteriores. Su sospecha clínica, diagnóstico y tratamiento de urgencia son un desafío para el cirujano general. Se presenta un caso real mediante vídeo ilustrativo que muestra cómo identificar un APP en tomografía computarizada, y cómo realizar su correcto drenaje quirúrgico.

Financiación

No se proporcionaron fondos para esta investigación.

Conflicto de intereses

Los autores no tienen ningún conflicto de intereses sobre este estudio.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2021.07.010](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2021.07.010).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: nataliapujol90@hotmail.com (N. Pujol-Cano).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2021.07.010>

0009-739X/© 2021 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.