



CIRUGÍA ESPAÑOLA

www.elsevier.es/cirugia



Video de mes

Orquiectomía preperitoneal durante hernioplastia mediante abordaje TEP



Preperitoneal orchietomy during hernioplasty by TEP approach

Paula Domínguez-Garijo *, Carolina González-Abós, Eugenia Butori y César Ginestà

Servicio de Cirugía General y Digestiva, Hospital Clínic de Barcelona, Universitat de Barcelona, Barcelona, España

Caso clínico

Varón de 41 años acude a consulta por hernia inguinal derecha para valoración quirúrgica. La exploración física corroboró la presencia de hernia inguinal indirecta derecha. Destacó la ausencia de testículo derecho, que el paciente refirió presentaba desde la infancia debido al ascenso adquirido del mismo.

El paciente fue intervenido de hernioplastia por vía laparoscópica por TEP (Total Extra-Peritoneal) con colocación de malla autofijable. Tras la reducción del saco herniario y lipoma preherniario se constató persistencia de contenido en canal inguinal. Durante la cirugía se identificó teste atrófico en

canal inguinal, por lo que se realizó la orquiectomía. La anatomía patológica descartó malignidad.

Diagnóstico: criptorquidia.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2021.08.009](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2021.08.009)

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: pdominguez@clinic.cat (P. Domínguez-Garijo).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2021.08.009>

0009-739X/© 2021 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.