



La imagen del mes

Volvulación de ciego secundaria a fibroma uterino degenerado

Cecal volvulus due to degenerated uterine leiomyoma

Laura Peñate Pérez*, José Luis Colombo García y Rafael Torrejón Cardoso

Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Puerta del Mar, Cádiz, España



Figura 1



Figura 2

Mujer de 57 años sin antecedentes patológicos que consulta por dolor abdominal de horas de evolución, afebril y tránsito intestinal conservado. A la exploración presenta un abdomen distendido y una masa dolorosa en hemiabdomen derecho. Análíticamente, leucocitosis leve y resto anodino.

En la radiografía de abdomen se observa dilatación intestinal y en el TAC abdominal dilatación de colón derecho (11 cm) compatible con vólvulo de ciego y una masa voluminosa (16 cm) adyacente en la pelvis con probable dependencia del ovario izquierdo (figs. 1 y 2). Se interviene quirúrgicamente realizándose hemicolectomía derecha e hysterectomía con doble anexectomía.

Diagnóstico anatomopatológico definitivo: fibroma uterino con degeneración hialina.

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: laurapenate17@gmail.com (L. Peñate Pérez).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2021.10.012>

0009-739X/© 2021 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.