



La imagen del mes

Cuerpo extraño intragástrico: tricobezoar gigante

Intragastric foreign body: Giant trichobezoar



Pablo del Val Ruiz*, Beatriz Carrasco Aguilera, Estrella O Turienzo Santos
y Lourdes M Sanz Álvarez

Sección de Tubo digestivo, Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), Oviedo, Principado de Asturias, España



Figura 1 – TAC de abdomen, proyección coronal.



Figura 2 – Extracción de bezoar a través de gastrotomía.

Caso clínico

Mujer de 28 años derivada desde su centro de salud por alteraciones analíticas en control rutinario, que evidencian anemia importante (Hb 4,2 g/dL), ferropenia, déficit de vitamina D y B12.

En la anamnesis refiere únicamente cierta pirosis y admite ingerir pelo de forma ocasional. A la exploración presenta abdomen depresible sin dolor ni distensión, pero con efecto masa bien definido en mesogastrio.

Se realiza tomografía computarizada (TAC) de abdomen, en el que se objetiva bezoar gástrico (fig. 1).

Se intenta extracción endoscópica sin éxito, por lo que se realiza gastrotomía y extracción de tricobezoar (fig. 2).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: pablodelvalruiz4@gmail.com (P. del Val Ruiz).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2021.12.004>

0009-739X/© 2021 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.