



La imagen del mes

Obstrucción intestinal por tricobezoar

Intestinal obstruction due to a trichobezoar



Concepción Franco Peñuelas^{*}, María Ángeles Gil-Olarte Márquez, Laura Sánchez Moreno y José Antonio López Ruiz

Unidad de Cirugía de Urgencias, Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo, Hospital Universitario Virgen Macarena, Sevilla, España



Figura 1



Figura 2

Paciente que acude a urgencias por dolor abdominal, reducción del apetito y vómito. A la palpación, abdomen doloroso en epigastrio con sensación de masa a la palpación profunda.

En la analítica hay leucocitosis de 27.790 μ L.

Se solicita TAC de abdomen (fig. 1) que informa de distensión de cámara gástrica hasta 9,2 cm con bezoar en su interior y otros dos bezoares en yeyuno que ocasionan obstrucción intestinal.

La cirugía, gastrotomía y enterotomía confirma el hallazgo de un tricobezoar gástrico y dos tricobezoares intestinales (fig. 2).

Postoperatorio favorable con alta el 5.º día, previa valoración por parte de psiquiatría.

^{*} Autor para correspondencia.

Correo electrónico: conchifp@gmail.com (C. Franco Peñuelas).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2022.03.011>

0009-739X/© 2022 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.