



Video del mes

Reparación transabdominal retromuscular de segunda recidiva de hernia umbilical

Laparoscopic trans-abdominal repair for a second recurrence of umbilical hernia

Génesis Parra-Eslava*, José Carlos Vaqué Alcázar, Elena Martínez Guerrero y Jetzabel Soria Estrems

Hospital de Llíria, Llíria, Valencia, España




Figura 1

En el video presentamos un caso de recidiva de hernia umbilical, con dos intervenciones previas (M3W2R2), tratado con reparación transabdominal retromuscular (TARM). Durante la cirugía se accede a la cavidad peritoneal, lo cual permite una manipulación segura del contenido herniario, especialmente en pacientes con reparaciones protésicas previas; se disecciona la aponeurosis para colocar la malla en posición retromuscular, evitando el contacto directo con las asas intestinales y reduciendo riesgos, como adherencias. El paciente intervenido presentó una evolución adecuada, siendo dado de alta a las 24 h y con revisión ambulatoria al mes y los 6 meses satisfactoria (fig. 1).

Conflicto de intereses

Los autores declaran que no hay conflicto de intereses relacionado con la publicación de este vídeo.

Anexo. Material adicional

Se puede consultar material adicional a este artículo en su versión electrónica disponible en [doi:10.1016/j.ciresp.2024.03.001](https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2024.03.001).

* Autor para correspondencia.

Correo electrónico: genesisparra_eslava@hotmail.com (G. Parra-Eslava).

<https://doi.org/10.1016/j.ciresp.2024.03.001>

0009-739X/© 2024 AEC. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.