



IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA

Síndrome de Marcos Gunn

Marcos Gunn syndrome



Edwin J. Anaya-Pava^a, Lyzeth A. Lara-Franco^{b,*} y Norma A. Castro-Santana^a

^a Servicio de Oftalmología, Instituto Mexicano del Seguro Social, Unidad Médica de Alta Especialidad n.º 71, Torreón, Coahuila, México

^b Servicio de Oftalmología, Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona n.º 16, Torreón, Coahuila, México

Acudió a consulta una paciente de 45 años por presbicia, y como hallazgo incidental a la exploración de párpados y anexos se evidenció una ptosis palpebral unilateral izquierda (fig. 1). Nunca había consultado a ningún oftalmólogo. Al documentar la historia clínica se encontró que la ptosis se presentaba desde el nacimiento y que desaparecía completamente con movimientos sincinéticos mandibulares hacia la derecha o durante la masticación, por estimulación del

músculo pterigoideo ipsilateral (fig. 2). El resto de la exploración oftalmológica fue normal. Sorpresivamente no le interesó derivación al servicio de oculoplástica.

Financiamiento

Los autores no recibieron patrocinio para llevar a cabo este artículo.

Conflicto de intereses

Los autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.



Figura 1 Blefaroptosis congénita unilateral izquierda.



Figura 2 Ptosis sincinética que remite a la estimulación del músculo pterigoideo ipsilateral.

* Autora para correspondencia: Servicio de Oftalmología, Instituto Mexicano del Seguro Social, Hospital General de Zona n.º 16, Torreón, Coahuila, México. Teléfono: +52 871 7212049.

Correo electrónico: lyzetharaceli@hotmail.com (L.A. Lara-Franco).