

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2012;63(1):82)

Liquen plano oral (en caso de diabetes)

Criterios de diferenciación




Figura 1. Alteraciones erosivas parcialmente hiperplásicas.

- Lesiones liquenoides en otras áreas.
- Posibilidad de alteraciones cutáneas.
- Mediana edad a edad avanzada.
- Desarrollo en la zona de lesiones reticulares inicialmente blanquecinas.
- Las alteraciones erosivas responden a los corticosteroides tópicos.

Diagnósticos diferenciales

Lesión liquenoide: anamnesis medicamentosa, causada por material (?), unilateral.

Infección por Candida: detección fúngica, depósitos que pueden eliminarse por fortación.

Lupus eritematoso: histología.

Carcinoma de células escamosas: ausencia de patrón liquenoide en la zona marginal, infiltrado palpable.

Tratamiento

Las lesiones erosivas (sintomáticas) se tratan con corticosteroides tópicos altamente eficaces.

Leucoplasia verrugosa proliferativa

Criterios de diferenciación

- Lesiones leucoplásicas en la región gingival.
- Ausencia de alteraciones cutáneas.
- Los pacientes suelen ser mayores de 70 años.
- Desarrollo a partir de leucoplasia «normal».
- No responde a los corticosteroides tópicos.

Diagnósticos diferenciales

Carcinoma de células escamosas: histología, palpación positiva.

Lesión tóxica: sin superficie verrugosa.




Figura 2. Lesión verrugosa en la región gingival.

Infección por Candida: depósito blanquecino, desprendible.

Leucoplasia (normal): crecimiento menos agresivo, menos recidiva.

Tratamiento

Clínica especializada.