

transversal, verificou-se uma prevalência significativa de deslocamento condilar transversal com significado clínico.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemd.2016.10.057>

#059. Deslocamento condilar numa amostra de pacientes de classe III esquelética



Eugénio Martins, Joana Cristina Silva*,
Maria João Ponces, Carlos André Pires,
Jorge Dias Lopes

FMDUP

Objetivos: Avaliar o deslocamento condilar da ATM numa população ortodôntica com classe III esquelética.

Materiais e métodos: A amostra foi constituída por 25 pacientes ortodônticos com registos iniciais completos, incluindo uma montagem de modelos em articulador semiajustável. Definiram-se os seguintes critérios de inclusão: classe III esquelética, pacientes com idade igual ou superior a 16 anos, ausência de história de traumatismos faciais, hiperplasias condilares ou intervenções cirúrgicas aos maxilares. Os modelos do paciente, previamente montados em articulador semiajustável, foram transferidos para o indicador de posição condilar (CPI[®], Panadent corporation) e o deslocamento condilar entre a posição de relação cêntrica (RC) e a posição de intercuspidação máxima (IM) foi determinado interpondo a cera de registo de IM entre os modelos e assinalando esta posição nos gráficos do CPI[®]. Foram registadas a distância em milímetros entre o ponto da posição de IM e o centro do gráfico (representando a RC) nos planos transversal, vertical e sagital. Considerou-se como clinicamente significativa uma discrepância RC-IM igual ou superior a 2 mm nos planos vertical e sagital, e igual ou superior a 0,5 mm no plano transversal.

Resultados: Os pacientes com classe III esquelética apresentaram um deslocamento igual ou superior a 2 mm no sentido sagital e vertical em 12% dos casos para a articulação direita e em 16% dos casos quando considerada a articulação esquerda. Tanto o deslocamento sagital médio como o vertical foram clinicamente significativos em 12% dos casos. Da observação dos diagramas de dispersão, verifica-se que nos pacientes de classe III esquelética existe uma distribuição heterogénea dos valores de deslocamento condilar no sentido sagital e vertical. No entanto, é notório algum predomínio do deslocamento condilar em sentido inferior. Quanto ao plano transversal, a distribuição do deslocamento transversal foi mais uniforme, não se verificando diferença significativa entre o lado direito ou esquerdo. Apenas 8% dos participantes não apresentam qualquer deslocamento transversal e em 28% dos casos o deslocamento foi clinicamente significativo.

Conclusões: A análise dos resultados sugere uma prevalência do deslocamento condilar no sentido vertical, sendo o deslocamento mais frequente em sentido inferior. Já no plano transversal, verificou-se uma prevalência significativa de deslocamento condilar transversal com significado clínico.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemd.2016.10.058>

#060. Parâmetros clínicos e radiográficos na terapêutica ortodôntico-cirúrgica da inclusão de caninos maxilares: estudo piloto



António Coelho*, Ricardo Figueiredo,
Tiago Borges, Miguel Silva Pereira,
Bruno Leitão de Almeida

Universidade Católica Portuguesa

Objetivos: O tratamento cirúrgico de caninos impactados divide-se em 2 possibilidades terapêuticas: a exposição cirúrgica para tração ortodôntica ou extração cirúrgica. A decisão depende de determinados fatores como: a avaliação radiográfica, que inclui a angulação do canino em relação à linha média da arcada superior, a distância vertical em relação à raiz do incisivo lateral e a posição méso-distal da ponta da cúspide do canino em relação à raiz do incisivo lateral assume especial importância na decisão terapêutica. Nesta investigação foi inferida a influência de parâmetros radiográficos da inclusão do canino maxilar e idade do paciente nos resultados clínicos, e previsibilidade da exposição e tração ortodôntica.

Materiais e métodos: Este estudo retrospectivo (coorte) incluiu 13 pacientes com diagnóstico de inclusão canina maxilar e plano de tratamento de exposição cirúrgica da coroa e tração ortodôntica. Diferentes variáveis (angulação do canino em relação à linha média da arcada superior, distância vertical em relação à raiz do incisivo lateral, posição méso-distal da ponta da cúspide do canino em relação à raiz do incisivo lateral e idade) foram calculadas e relacionadas com a duração do tratamento ortodôntico. Foi realizada análise estatística das variáveis através de teste t-Student. A significância estabeleceu-se em $p < 0,05$.

Resultados: Treze pacientes com uma idade média de $19,5 \pm 7,5$ anos, com diagnóstico de 14 caninos inclusos maxilares, foram incluídos neste estudo. Determinou-se uma angulação média do dente incluído de $36,5^\circ \pm 19,3$. O tempo de tratamento (em meses) apresentava uma média de $31,4 \pm 5,9$. Verificou-se que existiram diferenças estatisticamente significativas entre o tempo de tratamento e a idade do paciente ($p = 0,046$). Os cruzamentos entre as restantes variáveis demonstraram valores de $p > 0,05$, não havendo diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis.

Conclusões: O tratamento da inclusão de caninos maxilares através da tração ortodôntica é um tratamento previsível, como demonstram os resultados clínicos deste estudo. Foi possível estabelecer associação entre o tempo de tratamento e a idade do paciente. Os pacientes mais velhos (≥ 20 anos) tiveram um menor tempo de duração do tratamento. Outros estudos futuros são necessários para investigar variáveis que possam afetar a duração deste tipo de intervenção.

<http://dx.doi.org/10.1016/j.rpemd.2016.10.059>