

Imagen en medicina

Artritis reumatoide, la importancia del diagnóstico precoz

Rheumatoid arthritis, the importance of early diagnosis

Ana Morais Alves*, Sofia Perdigão, Cristiana Sousa, Marta Rodriguez y Fernando Salvador

Centro Hospitalar de Tras-os-Montes e Alto Douro, Portugal



Figura 1.



Figura 3.



Figura 2.



Figura 4.

* Autor para correspondencia.
Correo electrónico: ana.27.alves@gmail.com (A. Morais Alves).



Figura 5.




Figura 6.

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad sistémica autoinmune que se caracteriza por manifestaciones inflamatorias; la afectación articular es la más frecuente. Sin tratamiento hay una mayor progresión con erosión de huesos y cartílagos, traduciéndose en deformidades óseas importantes. Presentamos el caso de un varón de 69 años que acudió a Urgencias por artralgias en el carpo y las articulaciones metacarpofalángicas. Antecedentes de artrosis no tratada ni filiada. En la exploración presentaba flexión de codos a 5 grados, limitación en la extensión del carpo a 0 grados y flexión a 20 grados; atrofia de los interóseos, dedos en cuello de cisne, primeros dedos en Z y pies triangulares. En la analítica con aumento de reactantes de fase aguda (VS 61 mm/1.^a h), factor reumatoide (FR) positivo y anticuerpo anticitrulina negativo. Radiografías de manos y pies con erosión y destrucción articular. Se diagnosticó como AR, FR seropositiva (criterios diagnósticos ACR 2010, 9 puntos), con importante actividad inflamatoria (DAS28, 5,5). Inició tratamiento con prednisona, metotrexato y ácido fólico. Con este caso queremos señalar la importancia de un diagnóstico y tratamiento precoz para evitar progresión de la enfermedad y limitación funcional que puede ocasionar (figuras 1-6).