

## Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2009;60(2):142)

### Herpes zóster



Figura 1. Recubrimiento gingival parcialmente separable en la encía (Colección Prof. Hagedorn, Darmstadt).

#### Criterios de diferenciación

- Consistencia blanda
- Ampollas, costras, erosiones
- Anamnesis negativa de tratamiento con bifosfonatos
- Pródromos: dolor
- Ni infección ni intervención quirúrgica previas
- Alteraciones cutáneas segmentarias

#### Diagnósticos diferenciales

*Herpes simple*: menos extenso.

*Enfermedades ampollosas*: sin delimitación segmentaria, sin pródromos.

*Eritema exudativo multiforme*: sin delimitación segmentaria, alteraciones cutáneas: lesiones en escarapela.

*Varicela*: sin delimitación segmentaria, alteraciones cutáneas.

#### Tratamiento

Tratamiento antiviral, analgésicos, antisépticos locales.

### Necrosis maxilar asociada a bifosfonatos



Figura 2. Hueso maxilar necrótico expuesto (Colección Dr. Ludwig, Ulm).

#### Criterios de diferenciación

- Consistencia dura (hueso)
- Necrosis ósea
- Anamnesis de tratamiento con bifosfonatos
- Sin pródromos
- Inflamación local, cirugía odontológica
- Sin alteraciones cutáneas

#### Diagnósticos diferenciales

*Osteorradionecrosis*: anamnesis, radioterapia.

*Agranulocitosis*: anamnesis, hemograma.

*Necrosis fosfórica*: en la actualidad prácticamente no se dan casos (higiene en el trabajo).

*Osteomielitis*: hallazgos radiológicos, cuadro inflamatorio.

*Secuestro óseo después de la administración de Toxavit*: anamnesis, regiones maxilares dentadas.

#### Tratamiento

Centro especializado: resección quirúrgica del hueso, recubrimiento mediante cirugía reparadora.