

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2009;60(5):638)

Úlcera de decúbito



Figura 1. Lesión ulcerosa en el suelo de la boca (Colección Dr. Ludwig, Ulm).

Criterios de diferenciación

- Presencia de una prótesis sobredimensionada.
- Habitualmente dolorosa, con tendencia a la cronicidad.
- No se palpan infiltraciones, sólo un edema.
- Tejido adyacente sin alteraciones.
- La anamnesis relativa a los hábitos tóxicos (alcohol y tabaco) no aporta datos reseñables.
- Regresión después de acortar el margen lesivo de la prótesis.

Diagnósticos diferenciales

Neutropenia: hemograma, ausencia de margen protésico.

Leucemia: hemograma, ausencia de margen protésico.

Afta mayor: cuadro agudo, ausencia de margen protésico.

Primoinfección luética: serología, ausencia de margen protésico.

Tratamiento

Recorte del margen de la prótesis, seguimiento hasta la curación completa.

Carcinoma de células escamosas en el suelo de la boca




Figura 2. Alteraciones ulcerosas y leucoplásicas en el suelo de la boca.

Criterios de diferenciación

- Presencia no imprescindible de un margen protésico cortante.
- El dolor no es el síntoma predominante.
- Infiltración palpable.
- Alteración leucoplásica del tejido adyacente.
- Frecuentemente antecedentes de tabaquismo y alcoholismo en la anamnesis.
- En caso de presencia de un margen protésico, la lesión no mejora después de acortar el margen.

Diagnósticos diferenciales

Afta mayor: cuadro agudo, dolor.

Primoinfección luética: serología, inicio agudo, ausencia de lesiones leucoplásicas en el tejido adyacente.

Leucemia: hemograma.

Agranulocitosis: hemograma, ausencia de infiltrado.

Tratamiento

Centro especializado.