

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2009;60(10):1160)

Herpes labial



Figura 1. Vesículas, rágades y descamación en la zona de los labios.

Crterios de diferenciación

- Predominio en adultos.
- Evolución crónica recidivante.
- También lesiones intraorales.
- Origen vírico.
- Labios y piel adyacente.
- Sin traumatismo leve desencadenante.
- Posibilidad de contagio.

Diagnósticos diferenciales

Eritema exudativo multiforme: costras escamosas hemorrágicas, puede aparecer después de una infección herpética.

Herpes zóster: unilateral.

Eccema: inicio menos agudo, anamnesis.

Tratamiento

Viostático siempre que el tratamiento se inicie precozmente, posteriormente mantener una buena hidratación de los labios.

Impétigo contagioso



Figura 2. Costras y rágades en los labios y en la región perioral.

Crterios de diferenciación

- Normalmente afecta a niños.
- Posibilidad de recidiva.
- Sólo extraoral.
- Estreptococos/estafilococos.
- Pasa a la piel.
- Antecedentes de traumatismo leve inicial.
- Muy contagioso.

Diagnósticos diferenciales

Dermatitis perioral: ausencia de costras.

Candidiasis (sistémica): lesiones intraorales concomitantes, afectación de otras zonas cutáneas.

Eccema herpético: sobreinfección por virus del herpes simple en caso de neurodermitis.

Tratamiento

Antibióticos por vía oral.