

Diagnóstico diferencial de patologías de la mucosa oral

Wolfgang Bengel, Dr. med. dent.

(*Quintessenz*. 2009;60(9):1103)

Hiperplasia papilar



Figura 1. Hiperplasias múltiples en la zona cubierta por la prótesis.

Criterios de diferenciación

- Ausencia de alteraciones leucoplásicas.
- Ausencia de punto rojo central.
- También en no fumadores.
- Solo en zonas cubiertas por la prótesis.
- Pruebas positivas para *Candida*.

Diagnósticos diferenciales

Papiloma: no tan extenso, no limitado a la zona cubierta por la prótesis.

Papilomatosis: no localizada en zonas cubiertas por la prótesis, predisposición genética.

Carcinoma verrugoso: superficie verrugosa, epitelio no liso.

Tratamiento

Antimicóticos, ablación con láser, rebase.

Paladar del fumador



Figura 2. Alteraciones adoquinadas en el paladar.

Criterios de diferenciación

- Lesión leucoplásica.
- Punto rojo central.
- Fumadores (frecuentemente fumadores de pipa).
- En portadores de prótesis, fuera de la zona cubierta por la prótesis.
- Pruebas negativas para *Candida*.

Diagnósticos diferenciales

Leucoplasia: ausencia de punto rojo central en lesiones aisladas.

Lesión tóxica: ausencia de hiperqueratosis, ausencia de punto rojo central.

Tratamiento

Dejar de fumar, cuadro clínico autolimitado.